

Прикладная статистика

**ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ СОГЛАСИЯ
ОПЫТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ**

Часть II

Непараметрические критерии

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Новосибирским государственным техническим университетом, доработаны с участием Технического комитета по стандартизации ТК 125 «Стандартизация статистических методов управления качеством»

ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Стандартизация статистических методов управления качеством»

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 января 2002 г. № 24-ст

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1	Область применения	1
2	Общие положения	1
2.1	Простые и сложные гипотезы при проверке согласия опытного распределения с теоретическим	1
2.2	Распределения статистик непараметрических критериев согласия при простых гипотезах	2
2.2.1	Критерий Колмогорова	2
2.2.2	Критерий Смирнова	3
2.2.3	Критерии ω^2	3
2.3	Непараметрические критерии согласия при сложных гипотезах	4
2.3.1	Потеря критериями свойства «свободы от распределения»	4
2.3.2	Методика компьютерного анализа статистических закономерностей	5
2.3.3	Факторы, влияющие на распределения статистик критериев при проверке сложных гипотез	6
2.3.4	Влияние объема выборки на распределения статистик непараметрических критериев при простых и сложных гипотезах	6
2.3.5	Влияние объема выборки на мощность непараметрических критериев при простых и сложных гипотезах	8
2.3.6	Влияние метода оценивания на распределения статистик непараметрических критериев при сложных гипотезах	11
2.3.7	Метод оценивания и мощность непараметрических критериев согласия	17
2.3.8	Зависимость распределений статистик непараметрических критериев от конкретных значений параметра	20
2.3.9	Выводы	21
3	Порядок проверки гипотез о согласии	22
3.1	Порядок проверки простой гипотезы о согласии	22
3.1.1	Критерий Колмогорова при простой гипотезе	23
3.1.2	Критерий Смирнова при простой гипотезе	23
3.1.3	Критерии ω^2 Крамера — Мизеса — Смирнова при простой гипотезе	23
3.1.4	Критерий Ω^2 Андерсона — Дарлинга при простой гипотезе	23
3.2	Порядок проверки сложной гипотезы	23
3.2.1	Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Колмогорова	24
3.2.2	Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Смирнова	24
3.2.3	Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа ω^2 Мизеса	25
3.2.4	Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Ω^2 Мизеса	25
3.2.5	Проверка сложных гипотез о согласии с гамма-распределением	25
3.2.5.1	Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Колмогорова	25
3.2.5.2	Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Смирнова	26
3.2.5.3	Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа ω^2 Мизеса	26
3.2.5.4	Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Ω^2 Мизеса	26
3.2.6	Проверка сложных гипотез о согласии с распределениями Джонсона	27
3.2.7	Перечень распределений, для которых регламентирована проверка сложных гипотез с использованием настоящих рекомендаций	27
3.2.8	Законы распределения, используемые для аппроксимации предельных распределений статистик непараметрических критериев при проверке сложных гипотез	28
3.2.9	Примеры применения критериев согласия при простых и сложных гипотезах	29
	Приложение А Таблицы распределений статистик непараметрических критериев согласия при простых и сложных гипотезах	37
	Приложение Б Библиография	59

Введение

Необходимость разработки настоящих рекомендаций вызвана тем, что в нормативных документах по стандартизации, устанавливающих правила проверки оптимального распределения с теоретическим, не определены правила применения непараметрических критериев согласия типа Колмогорова или типа ω^2 Мизеса при проверке сложных гипотез. В связи с этим использование таких критериев в задачах контроля качества, исследования надежности и в других приложениях зачастую некорректно, вследствие чего — неверные статистические выводы.

Настоящие рекомендации, с одной стороны, являются практическим руководством, расширяющим благодаря полученным результатам сферу корректного применения критериев согласия при проверке сложных гипотез, с другой стороны, содержат новые сведения из рассматриваемого раздела математической статистики, предлагают опробованную методику исследования статистических закономерностей.

Прикладная статистика

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ СОГЛАСИЯ ОПЫТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ

Часть II. Непараметрические критерии

Applied statistics. Rules of check of experimental and theoretical distribution of the consent.
Part II. Nonparametric goodness-of-fit test

Дата введения 2002—07—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации, разработанные на основе [1], определяют правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим законом распределения непрерывной случайной величины.

Настоящие рекомендации могут быть использованы при разработке правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, применяемых Госстандартом России и использующих методы статистического анализа.

Настоящие рекомендации предназначены для использования в качестве руководства по применению непараметрических критериев согласия при статистической обработке результатов наблюдений, измерений, контроля, испытаний продукции.

2 Общие положения**2.1 Простые и сложные гипотезы при проверке согласия опытного распределения с теоретическим**

Применяя критерии согласия для проверки соответствия наблюдаемого опытного распределения теоретическому закону (далее — согласие), следует различать проверку простых и сложных гипотез.

Простая проверяемая гипотеза имеет вид $H_0: F(x) = F(x, \theta)$, где $F(x, \theta)$ — функция распределения вероятностей, с которой проверяют согласие наблюдаемой выборки, а θ — известное значение параметра (скалярного или векторного).

Сложная проверяемая гипотеза имеет вид $H_0: F(x) \in \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$, где Θ — область определения параметра θ . В этом случае оценку параметра распределения $\hat{\theta}$ вычисляют по той же самой выборке, по которой проверяют согласие. Если оценку $\hat{\theta}$ вычисляют по другой выборке, то гипотеза простая. Далее сложная гипотеза обозначена следующим образом $H_0: F(x) = F(x, \hat{\theta})$, где $\hat{\theta}$ — оценка параметра, вычисляемая по этой же выборке.

В процессе проверки согласия по выборке вычисляют значение S^* статистики используемого критерия. Затем для того, чтобы сделать вывод о принятии или отклонении гипотезы H_0 , необходимо знать условное распределение $G(S|H_0)$ статистики S при справедливости H_0 . И если вероятность

$$P\{S > S^*\} = \int_{S^*}^{\infty} g(s|H_0) ds \quad (1)$$

достаточно большая, по крайней мере $P\{S > S^*\} > \alpha$, где $g(s|H_0)$ — условная плотность, а α — задаваемый уровень значимости (вероятность ошибки 1-го рода — отклонить справедливую гипотезу H_0), то принято считать, что нет оснований для отклонения гипотезы H_0 .

Если в процессе анализа выборки рассматривают некоторую альтернативу $H_1: F(x) = F_1(x, \theta)$, то с ней связывают условное распределение $G(S|H_1)$ и вероятность ошибки 2-го рода β (принять гипотезу H_0 , в то время как верна гипотеза H_1). Задание значения α для применяемого критерия согласия однозначно определяет и значение β :

$$\alpha = \int_{S_\alpha}^{+\infty} g(s|H_0)ds, \tag{2}$$

$$\beta = \int_0^{S_\alpha} g(s|H_1) ds. \tag{3}$$

При этом, чем больше мощность критерия $1 - \beta$, тем лучше он различает соответствующие гипотезы.

2.2 Распределения статистик непараметрических критериев согласия при простых гипотезах

2.2.1 Критерий Колмогорова

В случае простых гипотез предельные распределения статистик рассматриваемых критериев согласия Колмогорова, Смирнова, ω^2 и Ω^2 Мизеса известны и независимы от вида наблюдаемого закона распределения и, в частности, от его параметров. Считают, что эти критерии являются «свободными от распределения». Это достоинство предопределяет широкое использование данных критериев в различных приложениях.

Предельное распределение статистики

$$D_n = \sup_{|x|<+\infty} |F_n(x) - F(x, \theta)|, \tag{4}$$

где $F_n(x)$ — эмпирическая функция распределения; $F(x, \theta)$ — теоретическая функция распределения; n — объем выборки, — было получено Колмогоровым в [2]. При $n \rightarrow \infty$ функция распределения статистики $\sqrt{n}D_n$ сходится равномерно к функции распределения Колмогорова

$$K(S) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 S^2}. \tag{5}$$

Наиболее часто в критерии Колмогорова (Колмогорова — Смирнова) используют статистику вида [3]

$$S_K = \frac{6nD_n + 1}{6\sqrt{n}}, \tag{6}$$

где

$$D_n = \max(D_n^+, D_n^-), \tag{7}$$

$$D_n^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - F(x_i, \theta) \right\}, \tag{8}$$

$$D_n^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ F(x_i, \theta) - \frac{i-1}{n} \right\}; \tag{9}$$

n — объем выборки; x_1, x_2, \dots, x_n — упорядоченные по возрастанию выборочные значения; $F(x, \theta)$ — функция закона распределения, согласие с которым проверяют. Распределение величины S_K при простой гипотезе в пределе подчиняется закону Колмогорова с функцией распределения $K(S)$.

Если для вычисленного по выборке значения статистики S_K^* выполняется неравенство

$$P\{S > S_K^*\} = 1 - K(S_K^*) > \alpha,$$

то нет оснований для отклонения гипотезы H_0 .

2.2.2 Критерий Смирнова

В критерии Смирнова используют статистику

$$D_n^+ = \sup_{|x| < \infty} (F_n(x) - F(x, \theta)) \quad (10)$$

или статистику

$$D_n^- = -\inf_{|x| < \infty} (F_n(x) - F(x, \theta)), \quad (11)$$

значения которых вычисляют по эквивалентным соотношениям (8), (9).

Реально в критерии обычно используют статистику [3]

$$S_m = \frac{(6nD_n^+ + 1)^2}{9n}, \quad (12)$$

которая при простой гипотезе в пределе подчиняется распределению χ^2 с числом степеней свободы, равным 2.

Гипотезу H_0 не отвергают, если для вычисленного по выборке значения статистики S_m^*

$$P\{S_m > S_m^*\} = \int_{S_m^*}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-x/2} dx = e^{-S_m^*/2} > \alpha.$$

2.2.3 Критерии ω^2

В критериях типа ω^2 расстояние между гипотетическим и истинным распределениями рассматривают в квадратичной метрике.

Проверяемая гипотеза H_0 имеет вид [3]

$$H_0: \int_{-\infty}^{\infty} \{E[F_n(x)] - F(x)\}^2 \psi(F(x)) dF(x) = 0 \quad (13)$$

при альтернативной гипотезе

$$H_1: \int_{-\infty}^{\infty} \{E[F_n(x)] - F(x)\}^2 \psi(F(x)) dF(x) > 0, \quad (14)$$

где $E[\cdot]$ — оператор математического ожидания; $\psi(t)$ — заданная на отрезке $0 \leq t \leq 1$ неотрицательная функция, относительно которой предполагают, что $\psi(t)$, $t\psi(t)$, $t^2\psi(t)$ интегрируемы на отрезке $0 \leq t \leq 1$ [4]. Статистику критерия [3] выражают соотношением

$$\begin{aligned} \omega_n^2[\psi(F)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \{E[F_n(x)] - F(x)\}^2 \psi(F(x)) dF(x) = \\ &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left\{ g[F(x_i)] - \frac{2i-1}{2n} f[F(x_i)] \right\} + \int_0^1 (1-t)^2 \psi(t) dt, \end{aligned} \quad (15)$$

где

$$g(t) = \int_0^t s\psi(s) ds, \quad f(t) = \int_0^t \psi(s) ds.$$

При выборе $\psi(t) \equiv 1$ для критерия ω^2 Мизеса получают статистику Крамера — Мизеса — Смирнова вида

$$S_\omega = n\omega_n^2 = \frac{1}{12n} + \sum_{i=1}^n \left\{ F(x_i, \theta) - \frac{2i-1}{2n} \right\}^2, \quad (16)$$

которая при простой гипотезе в пределе подчиняется закону с функцией распределения $a1(S)$, имеющей вид [3]

$$a1(S) = \frac{1}{\sqrt{2S}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\Gamma(j+1/2)\sqrt{4j+1}}{\Gamma(1/2)\Gamma(j+1)} \exp\left\{-\frac{(4j+1)^2}{16S}\right\} \left\{ I_{-\frac{1}{4}}\left[\frac{(4j+1)^2}{16S}\right] - I_{\frac{1}{4}}\left[\frac{(4j+1)^2}{16S}\right] \right\}, \quad (17)$$

где $I_{-\frac{1}{4}}(\cdot)$, $I_{\frac{1}{4}}(\cdot)$ — модифицированные функции Бесселя,

$$I_{\nu}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{z}{2}\right)^{\nu+2k}}{\Gamma(k+1)\Gamma(k+\nu+1)}, \quad |z| < \infty, \quad |\arg z| < \pi. \quad (18)$$

При выборе $\psi(t) \equiv 1/t(1-t)$ для критерия Ω^2 Мизеса статистика приобретает вид (статистика Андерсона — Дарлингга)

$$S_{\Omega} = n\Omega_n^2 = -n - 2 \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{2i-1}{2n} \ln F(x_i, \theta) + \left(1 - \frac{2i-1}{2n}\right) \ln(1 - F(x_i, \theta)) \right\}. \quad (19)$$

В пределе эта статистика подчиняется закону с функцией распределения $a2(S)$, имеющей вид [3]

$$a2(S) = \frac{\sqrt{2\pi}}{S} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{\Gamma(j+1/2)(4j+1)}{\Gamma(1/2)\Gamma(j+1)} \exp\left\{-\frac{(4j+1)^2 \pi^2}{8S}\right\} \int_0^{\infty} \exp\left\{\frac{S}{8(y^2+1)} - \frac{(4j+1)^2 \pi^2 y^2}{8S}\right\} dy. \quad (20)$$

Гипотезы о согласии не отвергают, если выполнены неравенства

$$P\{S_{\omega} > S_{\omega}^*\} = 1 - a1(S_{\omega}^*) > \alpha \quad \text{и} \quad P\{S_{\Omega} > S_{\Omega}^*\} = 1 - a2(S_{\Omega}^*) > \alpha.$$

2.3 Непараметрические критерии согласия при сложных гипотезах

2.3.1 Потеря критериями свойства «свободы от распределения»

При проверке сложных гипотез, когда по той же самой выборке оценивают параметры наблюдаемого закона распределения вероятностей, непараметрические критерии согласия Колмогорова, Смирнова, ω^2 и Ω^2 Мизеса теряют свойство «свободы от распределения». В этом случае предельные распределения статистик этих критериев будут зависеть от закона, которому подчинена наблюдаемая выборка. Более того, распределения статистик непараметрических критериев согласия зависят и от используемого метода оценивания параметров. Следует также учитывать, что распределения статистик существенно зависят от объема выборки.

Игнорирование того, что проверяют сложную гипотезу, неучет различия в сложных гипотезах приводят к некорректному применению непараметрических критериев согласия в приложениях и как следствие к неверным статистическим выводам. Различия в предельных распределениях тех же самых статистик при проверке простых и сложных гипотез настолько существенны, что пренебрегать этим абсолютно недопустимо [5] — [7].

Точкой отсчета, с которой были начаты исследования предельных распределений статистик непараметрических критериев согласия при сложных гипотезах, послужила работа [8].

Существует ряд подходов к использованию непараметрических критериев согласия в этом случае.

При достаточно большой выборке ее можно разбить на две части и по одной из них оценивать параметры, а по другой проверять согласие. В случае больших объемов выборки такой подход оправдан [9]. Но если объем выборки относительно невелик, то способ разбиения ее на две части будет отражаться и на оценках параметров, и на распределениях статистик критериев согласия.

Для случая принадлежности выборки нормальному закону предельные распределения статистики критерия ω^2 Мизеса при использовании оценок максимального правдоподобия для оценивания одного или обоих параметров закона были исследованы в [10] аналитическими методами.

В некоторых частных случаях проверки сложных гипотез, например при оценивании параметров распределений экспоненциального, нормального, экстремальных значений, Вейбулла и некоторых других законов, таблицы процентных точек для предельных распределений статистик непараметрических критериев были получены с использованием методов статистического моделирования [11] — [14].

В [15] — [19] для статистик типа Колмогорова — Смирнова и некоторых законов, соответствующих гипотезе H_0 , получены формулы для приближенного вычисления вероятностей «согласия»

вида $P\{S > S^*\}$, где S^* — вычисленное по выборке значение соответствующей статистики S . Полученные формулы дают достаточно хорошие приближения при малых значениях соответствующих вероятностей.

В [20], [21] в результате компьютерного моделирования распределений статистик непараметрических критериев для ряда законов, соответствующих гипотезе H_0 , найдены аналитически простые модели, которые хорошо аппроксимируют предельные распределения статистик непараметрических критериев согласия в случае проверки сложных гипотез и оценивания по выборке параметров методом максимального правдоподобия. В [22], [23] методами статистического моделирования исследовано влияние на распределения статистик непараметрических критериев согласия при простых и сложных гипотезах объема наблюдаемой выборки и применяемого метода оценивания параметров. В [24] получены аналитически простые модели предельных распределений статистик непараметрических критериев для случая, когда при проверке сложных гипотез оценки параметров находят в результате минимизации статистики используемого критерия.

Построенные таблицы процентных точек и предельные распределения статистик непараметрических критериев ограничены относительно узким кругом сложных гипотез. Предельные распределения статистик (или процентные точки распределений) при проверке сложных гипотез получены лишь для порядка 15 законов, в то время как множество вероятностных моделей, используемых в приложениях для описания реальных случайных величин, существенно шире.

2.3.2 Методика компьютерного анализа статистических закономерностей

Очевидно, что бесконечное множество случайных величин, с которым приходится сталкиваться на практике, не может быть описано ограниченным подмножеством моделей законов распределений, наиболее часто используемых для описания реальных наблюдений в приложениях. Любой исследователь для конкретной наблюдаемой величины может предложить (построить) свою параметрическую модель закона, наиболее адекватно, с его точки зрения, описывающего эту случайную величину. После оценки по данной выборке параметров модели возникает необходимость проверки сложной гипотезы об адекватности выборочных наблюдений и построенного закона с использованием критериев согласия.

Множество всех сложных гипотез бесконечно и заранее иметь распределения $G(S|H_0)$ для любой сложной гипотезы H_0 практически невозможно. Именно поэтому найденные различным образом предельные распределения статистик непараметрических критериев согласия представлены в литературных источниках лишь для ограниченного ряда распределений, наиболее часто используемых в приложениях, особенно в задачах контроля качества и исследования надежности. Что же делать, если для описания выборки используется закон распределения вероятностей $F(x, \theta)$ и найдена оценка его параметра $\hat{\theta}$, а для проверки сложной гипотезы $H_0: F(x) \in \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$ исследователю неизвестно распределение $G(S|H_0)$ статистики соответствующего критерия согласия?

Наиболее целесообразно воспользоваться методикой компьютерного анализа статистических закономерностей, хорошо зарекомендовавшей себя при моделировании распределений статистик критериев [20] — [25].

Для этого следует в соответствии с законом $F(x, \hat{\theta})$ смоделировать N выборок того же объема n , что и выборка, для которой необходимо проверить гипотезу $H_0: F(x) \in \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$. Далее для каждой из N выборок вычислить оценки тех же параметров закона, а затем значение статистики S соответствующего критерия согласия. В результате будет получена выборка значений статистики S_1, S_2, \dots, S_N с законом распределения $G(S_n|H_0)$ для проверяемой гипотезы H_0 . По этой выборке при достаточно большом N можно построить достаточно гладкую эмпирическую функцию распределения $G_N(S_n|H_0)$, которой можно непосредственно воспользоваться для вывода о том, следует ли принимать гипотезу H_0 . При необходимости, можно по $G_N(S_n|H_0)$ построить приближенную аналитическую модель, аппроксимирующую $G_N(S_n|H_0)$, и тогда уже, опираясь на эту модель, принимать решение относительно проверяемой гипотезы.

Как показывает практика, хорошей аналитической моделью для $G_N(S_n|H_0)$ часто оказывается один из следующих четырех законов: логарифмически нормальный, гамма-распределение, распределение Su -Джонсона или распределение Sl -Джонсона [21], [24]. Во всяком случае, всегда можно, опираясь на ограниченное множество законов распределения, построить модель в виде смеси законов [26], [27].

Реализация такой процедуры компьютерного анализа распределения статистики не содержит ни принципиальных, ни практических трудностей. Уровень вычислительной техники позволяет очень быстро получить результаты моделирования, а реализация алгоритма под силу инженеру, владеющему навыками программирования.

В то же время такая методика анализа распределений статистик имеет и недостатки, связанные с ограниченной точностью построения закона распределения статистики и возможным влиянием качества используемого датчика псевдослучайных чисел [28]. Поэтому при ее реализации обязательно следует контролировать качество датчиков, генерирующих числа в соответствии с требуемыми законами «наблюдаемых» случайных величин. Современные системы программирования включают в себя достаточно хорошие датчики, генерирующие псевдослучайные числа, распределенные по равномерному закону. При необходимости построения собственного датчика можно воспользоваться алгоритмами моделирования, изложенными в [29].

Точность построения закона распределения статистики на основании $G_N(S_n | H_0)$, конечно, можно повышать, увеличивая N . По оценкам [20] — [24], отклонения смоделированного распределения от теоретического при $N = 2000$ обычно имеют порядок $\approx \pm 0,015$. Если поставить такую цель, то, аппроксимируя эмпирические распределения теоретическими законами и усредняя их по реализациям (при многократном моделировании), можно, при необходимости, добиться более высокой точности построения закона распределения исследуемой статистики. Опираясь на построенное распределение $G_N(S_n | H_0)$, можно достаточно точно оценить значение $P\{S > S^*\}$, но значения процентных точек, полученные по $G_N(S_n | H_0)$, могут оказаться с существенной погрешностью. На практике же, проверяя различные гипотезы, чаще сравнивают полученное значение статистики S^* с соответствующей процентной точкой предельного распределения, что является менее информативным для принятия решения. Более предпочтительно принимать решение по достигнутому уровню значимости $P\{S > S^*\}$.

Во всех приводимых далее примерах, иллюстрирующих распределения статистик критериев $G_N(S_n | H_i)$, $i = \overline{0,1}$, в зависимости от различных факторов с применением изложенной методики число моделируемых выборок N принимали равным 2000, а их объем n , кроме особо отмеченных случаев, равным 1000.

2.3.3 Факторы, влияющие на распределения статистик критериев при проверке сложных гипотез

Распределения статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез зависят от характера этой сложной гипотезы. На закон распределения статистики $G(S | H_0)$ влияют следующие факторы, определяющие «сложность» гипотезы:

- вид наблюдаемого закона распределения $F(x, \theta)$, соответствующего истинной гипотезе H_0 ;
- тип оцениваемого параметра и число оцениваемых параметров;
- в некоторых ситуациях конкретное значение параметра (например, в случае гамма-распределения);
- используемый метод оценивания параметров.

При малых объемах выборки n распределение $G(S_n | H_0)$ зависит от n . Однако существенная зависимость распределения статистики от n наблюдается только при небольших объемах выборки. Уже при $n \geq 15-20$ распределение $G(S_n | H_0)$ достаточно близко к предельному $G(S | H_0)$ и зависимостью от n можно пренебречь.

В случае задания конкретной альтернативы [конкурирующей гипотезы H_1 , которой соответствует распределение $F_1(x, \theta)$], функция распределения статистики $G(S | H_1)$ также зависит от всех перечисленных факторов. Но в отличие от $G(S | H_0)$ распределение статистики $G(S | H_1)$ при справедливой гипотезе H_1 очень сильно зависит от объема выборки n . Именно благодаря этому с ростом n повышается способность критериев различать гипотезы и возрастает мощность критериев.

2.3.4 Влияние объема выборки на распределения статистик непараметрических критериев при простых и сложных гипотезах

В случае проверки простых гипотез предельными распределениями статистик критериев Колмогорова и Смирнова можно пользоваться при $n > 20$ [3]. Исследование методами статистического моделирования зависимости распределений статистик всех рассматриваемых здесь непараметрических критериев от объема выборки при проверке различных как простых, так и сложных гипотез показывает, что это справедливо во всех случаях.

Например, рисунок 1 иллюстрирует, как при увеличении объема выборки ($n = 5, 10, 20$) меняется распределение $G(S_n | H_0)$ статистики Колмогорова S_K в случае проверки простой гипотезы о принадлежности выборки нормальному закону. На этом рисунке отражено также предельное распределение статистики — функция распределения Колмогорова $K(S)$. Эмпирические распределения $G_N(S_n | H_0)$ при больших n практически сливаются с $K(S)$, и на рисунке они не показаны. Как видно, при малых n распределение существенно отличается от предельного, но уже при $n \geq 15-20$ ошибка при вычислении вероятности «согласия» $P\{S > S^*\}$ оказывается достаточно малой.




Рисунок 1 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_0)$ статистики S_K Колмогорова при простой гипотезе (H_0 — нормальное распределение): $n = 5, 10, 20$. $K(S)$ — функция предельного распределения Колмогорова




Рисунок 2 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_0)$ статистики S_K Колмогорова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение, ОМП): $n = 5, 10, 20, 1000$

Та же самая картина наблюдается в случае проверки сложных гипотез о согласии. На рисунке 2 при $n = 5, 10, 20, 1000$ представлены распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_K в случае проверки аналогичной, но уже сложной, гипотезы о нормальности, когда по выборке вычисляют оценки максимального правдоподобия (ОМП) параметров нормального закона.

При малых n наибольшие отклонения от предельных распределений наблюдаются на «хвостах». И при простых, и при сложных гипотезах с ростом n распределения $G(S_n | H_0)$ равномерно сходятся к предельному. Но если в случае простых гипотез с ростом n увеличивается вероятность больших значений статистик, то в случае сложных возрастают вероятности и больших, и малых значений статистик. Последнее замечание справедливо для распределений статистик S_K, S_ω, S_Ω .

Рисунок 3 иллюстрирует изменения с ростом n распределений $G(S_n | H_0)$ статистики Крамера — Мизеса — Смирнова S_ω при проверке сложной гипотезы о нормальности и использовании при оценивании параметров метода максимального правдоподобия. Чтобы подчеркнуть разницу в распределениях статистик при простых и сложных гипотезах, на указанном рисунке приведены $G(S_n | H_0)$ для $n = 5, 20, 1000$ и $a1(S)$ — предельная функция распределения статистики S_ω при проверке простой гипотезы.




Рисунок 3 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_0)$ статистики S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение, ОМП): $n = 5, 20, 1000$

Таким образом, распределения $G(S_n | H_0)$ статистик непараметрических критериев при простых и сложных гипотезах с ростом n очень быстро сходятся к предельным, и уже при $n \geq 15-20$ можно, не опасаясь больших ошибок, пользоваться этими предельными законами при анализе данных.

Однако последний вывод не означает, что при малых объемах выборок с помощью этих критериев можно успешно различать близкие гипотезы. Для надежного различения близких законов распределения, в частности с помощью критерия согласия Колмогорова, может потребоваться выборка достаточно большого объема [30].

2.3.5 Влияние объема выборки на мощность непараметрических критериев при простых и сложных гипотезах

Способность различать близкие гипотезы зависит от того, насколько сильно различаются распределения $G(S_n | H_0)$ и $G(S_n | H_1)$.

Предложены к рассмотрению две близкие гипотезы: H_0 — нормальное распределение с плот-

ностью $f_0(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$ и параметрами $\mu = 0, \sigma = 1$; H_1 — логистическое с такими же

параметрами $\mu = 0, \sigma = 1$ и плотностью $f_1(x) = \frac{\pi}{\sigma\sqrt{3}} \exp\left\{-\frac{\pi(x-\mu)}{\sigma\sqrt{3}}\right\} / \left[1 + \exp\left\{-\frac{\pi(x-\mu)}{\sigma\sqrt{3}}\right\}\right]^2$. О бли-

зости этих законов распределения можно судить по рисунку 4, на котором представлены их функции распределения. Рисунок 5 иллюстрирует зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_K Колмогорова при проверке простой ($n = 20, 100, 500, 1000$), а рисунок 6 — при проверке сложной гипотезы H_0 (при использовании ОМП).




Рисунок 4 — Функции распределения нормального и логистического законов




Рисунок 5 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_K Колмогорова при простой гипотезе (H_0 — нормальное распределение, H_1 — логистическое): $n = 20, 100, 500, 1000$




Рисунок 6 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_K Колмогорова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение, H_1 — логистическое, ОМП): $n = 20, 100, 500, 1000$

На рисунках 7, 8 для сравнения представлены распределения $G(S_n | H_1)$ статистики S_0 при проверке простой (рисунок 7) и сложной гипотезы (рисунок 8) для тех же самых альтернатив H_0 и H_1 . Для данной пары альтернатив в случае проверки сложной гипотезы критерий согласия типа ω^2 Крамера — Мизеса — Смирнова обладает несколько большей мощностью при различении близких гипотез, чем критерий типа Колмогорова, а в случае простых — наоборот.




Рисунок 7 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_0 Крамера — Мизеса — Смирнова при простой гипотезе (H_0 — нормальное распределение, H_1 — логистическое): $n = 20, 100, 500, 1000$




Рисунок 8 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_n Крамера — Мизеса — Смирнова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение, H_1 — логистическое, ОМП): $n = 20, 100, 500, 1000$

С точки зрения практического использования критериев важны два момента, которые подтверждены результатами исследований и хорошо иллюстрированы рисунками 5—8. Во-первых, очевидно, что при малых выборках пытаться различать с помощью непараметрических критериев согласия близкие гипотезы (особенно простые) абсолютно бесполезно. Во-вторых, мощность непараметрических критериев при проверке сложных гипотез при тех же объемах выборок n всегда существенно выше, чем при проверке простых.

При проверке простых гипотез непараметрические критерии типа Колмогорова, Смирнова, ω^2 и Ω^2 Мизеса уступают по мощности критериям типа χ^2 , особенно, если в последних используется асимптотически оптимальное группирование [31] — [34]. Но при проверке сложных гипотез непараметрические критерии оказываются более мощными. Для того чтобы воспользоваться их преимуществами, надо только знать распределение $G(S | H_0)$ при проверяемой сложной гипотезе.

2.3.6 Влияние метода оценивания на распределения статистик непараметрических критериев при сложных гипотезах

Распределения статистик критериев согласия существенно зависят от метода оценивания параметров, то есть каждому типу оценок при конкретной сложной проверяемой гипотезе соответствует свое предельное распределение $G(S | H_0)$ статистики. В данном случае по вполне очевидным причинам при проверке сложных гипотез сравним результаты использования ОМП и MD -оценок. При минимизации некоторого расстояния между эмпирической и теоретической функциями распределения получаются MD -оценки. Оценки максимального правдоподобия предпочтительны благодаря своим асимптотическим свойствам [35], [36], а в случае MD -оценок может минимизироваться значение статистики, используемой в критерии.

ОМП вычисляют в результате максимизации по θ функции правдоподобия

$$L(\theta) = \gamma \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) \quad (21)$$

или ее логарифма

$$\ln L(\theta) = \ln \gamma + \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta). \quad (22)$$

Чаще всего в случае скалярного параметра ОМП определяют как решение уравнения, а в случае векторного параметра — как решение системы уравнений правдоподобия вида

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_l} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln f(x_i, \theta)}{\partial \theta_l} = 0, l = \overline{1, m}, \quad (23)$$

где m — размерность вектора параметров θ . В общем случае эта система нелинейна и, за редким исключением, решается только численно.

При практическом использовании критериев необходимо иметь в виду следующее. В данном случае, как и в [20] — [24], при построении распределений статистик и исследовании их зависимости от метода оценивания ОМП вычисляли как решение системы (23). Если использовать грубые приближения ОМП, то это соответственно отражается на распределениях статистик и свойствах критериев.

При вычислении MD -оценок минимизируется соответствующее расстояние между эмпирическим и теоретическим распределениями. При использовании статистики Колмогорова S_K в качестве оценки вектора параметров θ выбирают значения, минимизирующие эту статистику:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} S_K \quad (24)$$

(MD -оценки S_K). Аналогично, при использовании статистики S_{ω} минимизируется по θ статистика S_{ω} :

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} S_{\omega} \quad (25)$$

(MD -оценки S_{ω}). При использовании статистики S_{Ω} —

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} S_{\Omega} \quad (26)$$

(MD -оценки S_{Ω}).

Вид используемой оценки оказывает существенное влияние на распределения статистик критериев согласия. Степень влияния метода оценивания на распределение статистики иллюстрирует рисунок 9, на котором показаны полученные в результате моделирования плотности распределения $g(S_n | H_0)$ статистики критерия типа Колмогорова S_K при вычислении оценок параметра сдвига нормального распределения тремя различными методами: минимизацией статистики S_K , минимизацией статистики S_{ω} и методом максимального правдоподобия. Функция плотности распределения Колмогорова обозначена на рисунке как $k(S)$.




Рисунок 9 — Плотности распределения $g(S_n | H_0)$ статистики S_K при проверке сложной гипотезы (H_0 — нормальный закон, оценивание сдвига с использованием 1 — MD -оценок S_K ; 2 — MD -оценок S_{ω} ; 3 — ОМП). $k(S)$ — плотность распределения Колмогорова

При использовании ОМП распределения статистик сильно зависят от соответствующего проверяемой гипотезе H_0 закона $F(x, \theta)$. На рисунке 10 приведены эмпирические распределения $G(S_n | H_0)$ статистики Колмогорова S_K , когда при проверке сложной гипотезы два параметра закона, соответствующего гипотезе H_0 , оценивали с использованием метода максимального правдоподобия. При этом на рисунке показаны распределения статистики $G(S_n | H_0)$, когда гипотеза H_0 соответствует законам: нормальному, логистическому, Лапласа с плотностью $f(x) = \frac{1}{2\theta_0} e^{-|x-\theta_1|/\theta_0}$, распределению наименьшего значения с плотностью $f(x) = \frac{1}{\theta_0} \exp\left\{\frac{x-\theta_1}{\theta_0} - \exp\left(\frac{x-\theta_1}{\theta_0}\right)\right\}$, распределению Коши с плотностью $f(x) = \frac{\theta_0}{\pi[\theta_0^2 + (x-\theta_1)^2]}$.




Рисунок 10 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики Колмогорова S_K при оценивании двух параметров закона, соответствующего гипотезе H_0 (здесь и далее: 1 — нормального; 2 — логистического; 3 — Лапласа; 4 — наименьшего значения; 5 — Коши), при использовании ОМП. $K(S)$ — функция распределения Колмогорова

При использовании MD -оценок, минимизирующих статистику применяемого критерия согласия, влияние закона $F(x, \theta)$, соответствующего проверяемой гипотезе H_0 , проявляется менее значительно. На рисунке 11 показаны распределения $G(S_n | H_0)$ той же статистики S_K при проверке тех же гипотез, но с использованием MD -оценок параметров, полученных минимизацией по параметрам статистики S_K .

На рисунке 12 приведены распределения статистики S_ω для аналогичных гипотез H_0 при использовании ОМП, а на рисунке 13 — при использовании MD -оценок, минимизирующих по параметрам статистику S_ω .

При использовании MD -оценок, минимизирующих по параметрам статистику S_ω , эмпирические распределения смоделированных распределений $G(S_n | H_0)$ практически совпадают для законов нормального, логистического, Лапласа, наименьшего значения, максимального значения с

плотностью $f(x) = \frac{1}{\theta_0} \exp\left\{-\frac{x-\theta_1}{\theta_0} - \exp\left(-\frac{x-\theta_1}{\theta_0}\right)\right\}$, распределения Вейбулла с плотностью




Рисунок 11 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики Колмогорова S_K при оценивании двух параметров закона, соответствующего гипотезе H_0 , при использовании MD -оценок S_K . $K(S)$ — функция распределения Колмогорова, предельная при простой гипотезе




Рисунок 12 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_w Крамера — Мизеса — Смирнова при оценивании двух параметров закона, соответствующего гипотезе H_0 , при использовании ОМП. $a1(S)$ — функция распределения, предельная при простой гипотезе




Рисунок 13 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова при оценивании двух параметров закона, соответствующего гипотезе H_0 , при MD -оценках S_ω

$f(x) = \frac{\theta_0 x^{\theta_0 - 1}}{\theta_1^{\theta_0}} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\theta_1}\right)^{\theta_0}\right\}$ и хорошо аппроксимируются логарифмически нормальным законом

с плотностью $f(s) = \frac{1}{s\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln s - \mu)^2 / 2\sigma^2}$ и параметрами $\mu = -3,2702$; $\sigma = 0,4719$.

Распределения статистик критериев согласия при использовании MD -оценок (как и в случае использования ОМП) существенно зависят от того, какой параметр оценивали. На рисунке 14 показаны распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова при использовании MD -оценок S_ω и оценивании масштабного параметра закона, соответствующего гипотезе H_0 . На рисунке 15 представлены аналогичные распределения статистик, но при оценивании для тех же распределений параметра сдвига. Распределения статистик в случае оценивания параметра сдвига распределения максимального значения и масштабного параметра распределения Вейбулла совпадают с распределением статистики для распределения минимального значения.

Если обратить внимание на рисунок 16, на котором отображены распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_ω при проверке согласия с распределениями экспоненциальным $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, полу-

нормальным $f(x) = \frac{2}{\theta\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\theta^2}$, Рэлея $f(x) = \frac{x}{\theta^2} e^{-x^2/2\theta^2}$, Максвелла $f(x) = \frac{2x^2}{\theta^3\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\theta^2}$, моду-

ля m -мерного ($m = 5$) нормального вектора $f(x) = \frac{2x^{m-1}}{(2\theta^2)^{m/2} \Gamma(m/2)} e^{-x^2/2\theta^2}$ при оценивании маш-

табного параметра соответствующего закона с использованием MD -оценок S_ω , то можно заметить, что распределения статистик близки к приведенным на рисунке 15. Распределения статистик, показанные на рисунке 16, например, достаточно хорошо аппроксимируются логарифмически нормальным законом с параметрами $\mu = -2,8484$; $\sigma = 0,5669$.




Рисунок 14 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_{ω} Крамера — Мизеса — Смирнова при оценивании масштабного параметра закона, соответствующего гипотезе H_0 , (δ — максимального значения; 7 — Вейбулла, параметр формы), при использовании MD -оценок S_{ω}




Рисунок 15 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_{ω} Крамера — Мизеса — Смирнова при оценивании параметра сдвига, соответствующего гипотезе H_0 , при MD -оценках S_{ω}




Рисунок 16 — Распределения $G(S_n | H_0)$ статистики S_n Крамера — Мизеса — Смирнова при оценивании масштабного параметра закона, соответствующего гипотезе H_0 , (1 — экспоненциального; 2 — полунормального; 3 — Рэлея; 4 — Максвелла; 5 — модуля 5-мерного нормального вектора), при использовании MD -оценок S_n

Таким образом, применяя непараметрические критерии согласия, следует непременно учитывать используемый метод оценивания. При этом в случае метода максимального правдоподобия распределения статистик $G(S | H_0)$ очень сильно зависят от закона, соответствующего гипотезе H_0 . Разброс распределений $G(S | H_0)$ при использовании MD -оценок, минимизирующих статистику критерия, зависит от закона $F(x, \theta)$, соответствующего гипотезе H_0 , в существенно меньшей степени.

2.3.7 Метод оценивания и мощность непараметрических критериев согласия

При использовании MD -оценок, минимизирующих статистику критерия, эмпирические распределения $G(S_n | H_0)$, соответствующие различным гипотезам H_0 , имеют минимальный разброс, что означает определенную «свободу от распределения» для рассматриваемых критериев и предполагает применение MD -оценок при проверке сложных гипотез. Но если исследовать мощность рассматриваемых критериев при различных методах оценивания, то оказывается, что максимальную мощность непараметрические критерии при близких альтернативах имеют в случае оценивания параметров методом максимального правдоподобия.

Способность применяемого критерия различать альтернативы H_0 и H_1 зависит от его мощности $1 - \beta$ при заданном уровне значимости α , а именно от того, насколько существенно отличаются распределения статистики $G(S_n | H_0)$ и $G(S_n | H_1)$. При одинаковых объемах выборок n отличие распределений $G(S_n | H_0)$ и $G(S_n | H_1)$ в случае использования ОМП более значительно, а следовательно, критерий оказывается более мощным, чем в случае использования MD -оценок.

Например, рисунок 17 иллюстрирует зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_K Колмогорова при проверке сложной гипотезы при паре альтернатив H_0 — нормальное распределение, H_1 — логистическое и использовании MD -оценок S_K , а рисунок 18 — зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова при использовании MD -оценок S_ω .

Сравнивая рисунок 17 с рисунком 6, а рисунок 18 с рисунком 8, можно убедиться, что в случае использования метода максимального правдоподобия мощность критериев типа Колмогорова и типа ω^2 Мизеса много выше, чем при использовании соответствующих MD -оценок. Аналогичная картина справедлива и для критерия типа Ω^2 Мизеса со статистикой S_Ω Андерсона — Дарлинга.




Рисунок 17 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_K Колмогорова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение; H_1 — логистическое; MD -оценки S_K): $n = 20, 100, 500, 1000$




Рисунок 18 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение; H_1 — логистическое; MD -оценки S_ω): $n = 100, 500, 1000$

Для того чтобы сравнить по мощности непараметрические критерии согласия для рассматриваемой пары близких гипотез H_0 и H_1 при использовании ОМП, на рисунке 19 приведены распределения $G(S_{1000} | H_0)$ и $G(S_n | H_1)$ при $n = 20, 100, 500, 1000$ для статистики S_Ω Андерсона — Дарлинга, а на рисунке 20 — для статистики S_m Смирнова.




Рисунок 19 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_Ω Андерсона — Дарлинга при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение; H_1 — логистическое; ОМП): $n = 20, 100, 500, 1000$




Рисунок 20 — Зависимость от n распределений $G(S_n | H_1)$ статистики S_m Смирнова при сложной гипотезе (H_0 — нормальное распределение; H_1 — логистическое; ОМП): $n = 20, 100, 500, 1000$

Анализируя распределения на рисунках 6, 8, 19 и 20 можно заметить, что наиболее мощным для данной пары гипотез является критерий Ω^2 со статистикой S_Ω Андерсона — Дарлинга, затем критерий ω^2 со статистикой S_ω Крамера — Мизеса — Смирнова, далее критерий Колмогорова со статистикой S_K и на последнем месте критерий Смирнова со статистикой S_m . Данное наблюдение о порядке предпочтения критериев хорошо согласуется с опытом их применения.

Почему мощность рассматриваемых критериев при проверке близких гипотез в случае ОМП выше, чем при *MD*-оценках, достаточно логично объясняет следующая версия. Использование *MD*-оценок, минимизирующих статистику критерия, приводит к распределению $G(S|H_0)$ с меньшим параметром масштаба (к более крутой функции распределения), чем в случае ОМП. Но с другой стороны, *MD*-оценки в отличие от ОМП являются робастными, они менее чувствительны к малым отклонениям выборки от предполагаемого закона распределения. Поэтому функция распределения $G(S_n|H_1)$ оказывается еще более крутой по отношению к аналогичному распределению при использовании ОМП.

2.3.8 Зависимость распределений статистик непараметрических критериев от конкретных значений параметра

В некоторых случаях предельные распределения $G(S|H_0)$ рассматриваемых статистик при проверке сложных гипотез зависят от конкретных значений параметров распределения, с которым проверяют согласие. В частности, распределения $G(S|H_0)$ непараметрических критериев согласия в случае проверки согласия с гамма-распределением с плотностью

$$f(x) = \frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} x^{\theta_0-1} e^{-x/\theta_1}$$

зависят от его параметра формы θ_0 . Для иллюстрации приведены лишь распределения $G(S|H_0)$ статистики Колмогорова S_K . На рисунке 21 показаны распределения статистики при оценивании по выборке параметра формы, на рисунке 22 — масштабного параметра, на рисунке 23 — двух параметров распределения. На этих рисунках цифрами по порядку помечены функции распределения статистики: 1 — при $\theta_0 = 0,5$; 2 — при $\theta_0 = 1,0$; 3 — при $\theta_0 = 2,0$; 4 — при $\theta_0 = 3,0$; 5 — при $\theta_0 = 5,0$. Для сравнения приведена функция распределения Колмогорова $K(S)$.

С ростом θ_0 предельные распределения статистик сходятся к предельным распределениям статистик для выборок из нормального закона. При значениях $\theta_0 > 5$ эмпирические распределения статистик при оценивании двух параметров практически совпадают и хорошо согласуются с распределением соответствующей статистики для нормального закона.

Общая картина принципиально сохраняется и для распределений других непараметрических статистик.




Рисунок 21 — Функции распределения статистики S_K Колмогорова при вычислении ОМП параметра формы гамма-распределения: $K(S)$ —функция распределения Колмогорова




Рисунок 22 — Функции распределения статистики S_K Колмогорова при вычислении ОМП масштабного параметра гамма-распределения. $K(S)$ —функция распределения Колмогорова




Рисунок 23 — Функции распределения статистики S_K Колмогорова при оценивании методом максимального правдоподобия одновременно двух параметров гамма-распределения. $K(S)$ —функция распределения Колмогорова

2.3.9 Выводы

На основании изложенного выше можно сформулировать следующие выводы и дать рекомендации.

Распределения статистик непараметрических критериев согласия при простых и сложных гипотезах с ростом n быстро сходятся к предельным законам. Уже при $n \geq 20$, не опасаясь больших ошибок, можно пользоваться этими предельными законами для вычисления достигаемого уровня значимости $P\{S > S^*\}$.

В то же время надо иметь в виду, что различать близкие гипотезы (особенно простые) при малых выборках с помощью непараметрических критериев согласия невозможно.

Мощность непараметрических критериев при проверке сложных гипотез при тех же объемах выборок n всегда существенно выше, чем при проверке простых.

При проверке сложных гипотез распределения статистик $G(S|H_0)$ непараметрических критериев зависят не только от закона распределения $F(x, \theta)$, соответствующего гипотезе H_0 , числа и вида оцениваемых параметров (иногда конкретного значения параметра), но и от используемого метода оценивания параметров. Ни в коем случае нельзя, оценивая параметры одним методом, использовать (предельный) закон распределения статистики, построенный для другого метода оценивания.

В случае применения MD -оценок, минимизирующих статистику используемого критерия согласия, распределения статистик непараметрических критериев в меньшей степени подвержены зависимости от вида $F(x, \theta)$, соответствующего гипотезе H_0 . Однако наиболее мощными эти критерии оказываются при использовании ОМП.

В случае простых гипотез и при близких альтернативах непараметрические критерии согласия уступают по мощности критериям типа χ^2 . В случае проверки сложных гипотез — преимущество за непараметрическими критериями согласия. В то же время рекомендуется при проверке гипотез о согласии не останавливаться на использовании одного из критериев согласия, так как каждый из критериев по-разному улавливает различные отклонения эмпирического распределения от теоретического.

Изложенная опробованная методика моделирования распределений статистик при корректном ее применении может быть рекомендована для построения статистических закономерностей в ситуации, когда аналитическими методами не удается решить задачу.

Применение при проверке сложных гипотез распределений статистик критериев согласия, представленных в настоящих рекомендациях, правомерно при использовании ОМП или MD -оценок соответственно. Некорректно использование оценок по методу моментов (за исключением тех ситуаций, когда оценки по методу моментов совпадают с ОМП), использование различных оценок по наблюдениям, сгруппированным в интервалы. Некорректно вычисление значений статистик непараметрических критериев согласия по группированным наблюдениям.

3 Порядок проверки гипотез о согласии

3.1 Порядок проверки простой гипотезы о согласии

При проверке согласия опытного распределения с теоретическим распределением случайной величины X действуют следующим образом.

а) Формулируют проверяемую гипотезу, выбирая теоретическое распределение случайной величины, согласие которого с опытным распределением этой величины следует проверить.

б) Из совокупности отбирают случайную выборку объема n . Полученные результаты наблюдений располагают в порядке их возрастания, так что в распоряжении имеют упорядоченную выборку значений

$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n.$$

в) В соответствии с выбранным критерием проверки вычисляют значение статистики S^* критерия [по формулам (6), (12), (15) или (16)].

г) В соответствии с выбранным критерием проверки вычисляют значение

$$P\{S > S^*\} = \int_{S^*}^{+\infty} g(s|H_0) ds = 1 - G(S^*|H_0) \text{ где } G(S|H_0) \text{ — распределение статистики критерия при}$$

справедливости гипотезы H_0 . Если $P\{S > S^*\} > \alpha$, где α — задаваемый уровень значимости, то нет оснований для отклонения проверяемой гипотезы. В противном случае проверяемую гипотезу H_0 отвергают.

Можно вычисленное значение статистики S^* сравнить с критическим значением S_α , определяемым из условия $\alpha = \int_{S_\alpha}^{+\infty} g(s|H_0) ds$. Гипотезу о согласии отвергают, если значение статистики

попадает в критическую область, т. е. при $S^* > S_\alpha$.

3.1.1 Критерий Колмогорова при простой гипотезе

Порядок проверки простой гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим — в соответствии с 3.1, перечисления а) — г).

В случае выбранного критерия Колмогорова:

а) Значение статистики Колмогорова S_K вычисляют по формуле (6) на основании формул (7) — (9).

б) Значение вероятности $P\{S > S_K^*\} = 1 - K(S_K^*)$ вычисляют по функции распределения Колмогорова [формула (5)] или берут из таблицы А.1.

в) Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.2.

3.1.2 Критерий Смирнова при простой гипотезе

Порядок проверки простой гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим — в соответствии с 3.1, перечисления а) — г).

В случае выбранного критерия Смирнова:

а) Значение статистики Смирнова S_m вычисляют по формуле (12) на основании формул (8), (9).

б) Значение вероятности $P\{S_m > S_m^*\} = e^{-S_m^*/2}$ вычисляют по функции χ_2^2 -распределения (с двумя степенями свободы).

в) Гипотезу H_0 не отвергают, если для вычисленного по выборке значения статистики S_m^*

$$P\{S_m > S_m^*\} = e^{-S_m^*/2} > \alpha.$$

3.1.3 Критерий ω^2 Крамера — Мизеса — Смирнова при простой гипотезе

Порядок проверки простой гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим — в соответствии с 3.1, перечисленная а) — г).

В случае выбранного критерия Крамера — Мизеса — Смирнова:

а) Значение статистики Крамера — Мизеса — Смирнова S_ω вычисляют по формуле (16).

б) Значение вероятности $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 1 - a1(S_\omega^*)$ вычисляют по функции распределения $a1(S)$ (17) или берут из таблицы А.3.

в) Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.4.

г) Гипотезу H_0 не отвергают, если для вычисленного по выборке значения статистики S_ω^*

$$P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 1 - a1(S_\omega^*) > \alpha.$$

3.1.4 Критерий Ω^2 Андерсона — Дарлинга при простой гипотезе

Порядок проверки простой гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим — в соответствии с 3.1, перечисления а) — г).

В случае выбранного критерия Ω^2 Андерсона — Дарлинга:

а) Значение статистики Андерсона — Дарлинга S_Ω вычисляют по формуле (19).

б) Значение вероятности $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 1 - a2(S_\Omega^*) > \alpha$ вычисляют по функции распределения $a2(S)$ (20) или берут из таблицы А.5.

в) Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.6.

г) Гипотезу H_0 не отвергают, если для вычисленного по выборке значения статистики S_Ω^*

$$P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 1 - a2(S_\Omega^*) > \alpha.$$

3.2 Порядок проверки сложной гипотезы

При проверке согласия опытного распределения с теоретическим распределением случайной величины X действуют следующим образом.

а) Формулируют проверяемую гипотезу, выбирая теоретическое распределение $F(x, \theta)$ случайной величины, согласие которого с опытным распределением этой величины следует проверить. Перечень теоретических распределений, для которых возможна проверка сложных гипотез с использованием данных рекомендаций, приведен в 3.2.7.

б) Из совокупности отбирают случайную выборку объема n . Полученные результаты наблюдений располагают в порядке их возрастания, так что в распоряжении имеют упорядоченную выборку значений

$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n.$$

в) По выборке вычисляют оценки параметров распределения $F(x, \theta)$, выбранного в соответствии с перечислением а) [оценки максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23) или MD -оценки, минимизирующие статистику критерия на основании, соответственно, формул (24), (25) или (26)].

г) В соответствии с выбранным критерием проверки вычисляют значение статистики S^* критерия [по формулам (6), (12), (15) или (16)].

д) В соответствии с выбранным критерием проверки, теоретическим распределением $F(x, \theta)$, оцененным параметром или параметрами, используемым методом оценивания определяют распределение статистики критерия $G(S|H_0)$ при справедливости гипотезы H_0 .

е) На основании выбранного в соответствии с перечислением д) распределения $G(S|H_0)$ вычисляют значение

$$P\{S > S^*\} = \int_{S^*}^{+\infty} g(s|H_0) ds = 1 - G(S^*|H_0).$$

ж) Если $P\{S > S^*\} > \alpha$, где α — задаваемый уровень значимости, то нет оснований для отклонения проверяемой гипотезы. В противном случае проверяемую гипотезу H_0 отвергают. Можно вычисленное значение статистики S^* сравнить с критическим значением S_α , определяемым из условия

$$\alpha = \int_{S_\alpha}^{+\infty} g(s|H_0) ds. \text{ Гипотезу о согласии не отвергают, если } S^* < S_\alpha.$$

Если закон распределения, относительно которого проверяют гипотезу о согласии с использованием непараметрического критерия, не входит в перечень, приведенный в 3.2.7, то для построения распределения статистики $G(S|H_0)$, соответствующего проверяемой гипотезе H_0 , рекомендуется воспользоваться методикой компьютерного анализа, изложенной в 2.3.2.

3.2.1 Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Колмогорова

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим по критерию типа Колмогорова — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения, связанные с указанным видом статистики, следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра распределения $F(x, \theta)$ можно вычислять методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23) или при минимизации статистики S_K на основании формулы (24).

б) Значение статистики Колмогорова S_K (при использовании ОМП) или ее минимума [при использовании MD -оценок — формула (24)] вычисляют по формуле (6) на основании формул (7) — (9).

в) Распределение $G(S_K|H_0)$ в случае использования ОМП в соответствии с теоретическим распределением $F(x, \theta)$, оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.7. Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.8.

г) В случае использования MD -оценок [формула (26)] распределение $G(S_K|H_0)$ выбирают из таблицы А.9, а критические значения критерия S_α могут быть взяты из таблицы А.10.

д) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_K^*\} = 1 - G(S_K^*|H_0) > \alpha$ (или $S_K^* < S_\alpha$).

3.2.2 Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Смирнова

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим с использованием критерия типа Смирнова — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения критерия типа Смирнова следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра распределения $F(x, \theta)$ вычисляют методом максимального правдоподобия [формулы (21) — (23)].

б) Значение статистики Смирнова S_m вычисляют по формуле (12) на основании формул (8), (9).

в) Распределение $G(S_m | H_0)$ в случае использования ОМП в соответствии с теоретическим распределением $F(x, \theta)$, оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.11. Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.12.

г) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_m^*\} = 1 - G(S_m^* | H_0) > \alpha$ (или $S_m^* < S_\alpha$).

3.2.3 Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа ω^2 Мизеса

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим по критерию типа ω^2 Мизеса — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения критерия типа ω^2 Мизеса следующие.

а) Оценка скалярного или векторного параметра распределения $F(x, \theta)$ может быть вычислена методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23) или при минимизации статистики S_ω на основании формулы (25).

б) Значение статистики Крамера — Мизеса — Смирнова S_ω (при использовании ОМП) или ее минимума [при использовании *MD*-оценок формула (25)] вычисляют по формуле (16).

в) Распределение $G(S_\omega | H_0)$ в случае использования ОМП в соответствии с теоретическим распределением $F(x, \theta)$, оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.13. Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.14.

г) В случае использования *MD*-оценок [формула (27)] распределение $G(S_\omega | H_0)$ выбирают из таблицы А.15. Критические значения критерия S_α могут быть взяты из таблицы А.16.

д) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_\omega^*\} = 1 - G(S_\omega^* | H_0) > \alpha$ (или $S_\omega^* < S_\alpha$).

3.2.4 Проверка сложной гипотезы о согласии по критерию типа Ω^2 Мизеса

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим по критерию типа Ω^2 Мизеса — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения указанного критерия следующие.

а) Оценка скалярного или векторного параметра распределения $F(x, \theta)$ может быть вычислена методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23) или при минимизации статистики S_Ω на основании формулы (26).

б) Значение статистики Андерсона — Дарлинга S_Ω (при использовании ОМП) или ее минимума [при использовании *MD*-оценок формула (26)] вычисляют по формуле (19).

в) Распределение $G(S_\Omega | H_0)$ в случае использования ОМП в соответствии с теоретическим распределением $F(x, \theta)$, оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.17. Критические значения критерия S_α при заданном α могут быть взяты из таблицы А.18.

г) В случае использования *MD*-оценок [формула (28)] распределение $G(S_\Omega | H_0)$ выбирают из таблицы А.19. Критические значения критерия S_α могут быть взяты из таблицы А.20.

д) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_\Omega^*\} = 1 - G(S_\Omega^* | H_0) > \alpha$ (или $S_\Omega^* < S_\alpha$).

3.2.5 Проверка сложных гипотез о согласии с гамма-распределением

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим гамма-распределением — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения рассматриваемых критериев заключаются в том, что предельные распределения статистик критериев в данном случае зависят от значения параметра формы θ_0 гамма-распределения (см. таблицу 1). Кроме того, модели распределений статистик при проверке согласия с гамма-распределением построены только для случая использования ОМП и для ограниченного ряда значений параметра формы θ_0 .

При необходимости проверки гипотезы о согласии для значения параметра θ_0 , не совпадающего с представленными в таблицах А.21 — А.28, следует воспользоваться законом распределения соответствующей статистики (или процентными точками) при ближайшем к θ_0 табличном значении этого параметра. Можно найти искомые приближенные значения вероятности $P\{S > S^*\}$ (или процентных точек) с помощью интерполяции.

3.2.5.1 Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Колмогорова

Общий порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим гамма-распределением — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения, связанные с видом статистики, следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра гамма-распределения вычисляют методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23).

б) Значение статистики Колмогорова S_K вычисляют по формуле (6) на основании формул (7) — (9).

в) Распределение $G(S_K | H_0)$ в соответствии с оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.21. Критическое значение критерия S_α при заданном α может быть взято из таблицы А.22. Если значение параметра формы θ_0 не совпадает ни с одним из табличных, искомые значения $P\{S > S_K^*\}$ или квантили S_α определяют интерполяцией.

г) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_K^*\} = 1 - G(S_K^* | H_0) > \alpha$ (или $S_K^* < S_\alpha$).

3.2.5.2 Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Смирнова

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим гамма-распределением с использованием критерия типа Смирнова — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения указанного критерия следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра гамма-распределения вычисляют методом максимального правдоподобия по формулам (21) — (23).

б) Значение статистики Смирнова S_m вычисляют по формуле (12) на основании формул (8), (9).

в) Распределение $G(S_m | H_0)$ в соответствии с оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.23. Критическое значение критерия S_α при заданном α может быть взято из таблицы А.24. Если значение параметра формы θ_0 не совпадает ни с одним из табличных, искомые значения $P\{S > S_m^*\}$ или критические значения критерия S_α при заданном α определяют интерполяцией.

г) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_m^*\} = 1 - G(S_m^* | H_0) > \alpha$ (или $S_m^* < S_\alpha$).

3.2.5.3 Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа ω^2 Мизеса

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим гамма-распределением по критерию типа ω^2 Мизеса — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения указанного критерия следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра гамма-распределения вычисляют методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23).

б) Значение статистики Крамера — Мизеса — Смирнова S_ω вычисляют по формуле (16).

в) Распределение $G(S_\omega | H_0)$ в соответствии с оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.25. Критическое значение критерия S_α при заданном α может быть взято из таблицы А.26. Если значение параметра формы θ_0 не совпадает ни с одним из табличных, искомые значения $P\{S > S_\omega^*\}$ или критические значения критерия S_α при заданном α определяют интерполяцией.

г) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_\omega^*\} = 1 - G(S_\omega^* | H_0) > \alpha$ (или $S_\omega^* < S_\alpha$).

3.2.5.4 Проверка сложной гипотезы о согласии с гамма-распределением по критерию типа Ω^2 Мизеса

Порядок проверки сложной гипотезы о согласии опытного распределения с теоретическим гамма-распределением по критерию типа Ω^2 Мизеса — в соответствии с 3.2, перечисления а) — ж).

Особенности применения указанного критерия следующие.

а) Оценку скалярного или векторного параметра гамма-распределения вычисляют методом максимального правдоподобия на основании формул (21) — (23).

б) Значение статистики Андерсона — Дарлинга S_Ω вычисляют по формуле (19).

в) Распределение $G(S_\Omega | H_0)$ в соответствии с оцененным параметром или параметрами выбирают из таблицы А.27. Критическое значение критерия S_α при заданном α может быть взято из таблицы А.28. Если значение параметра формы θ_0 не совпадает ни с одним из табличных, искомые значения $P\{S > S_\Omega^*\}$ или критические значения критерия S_α при заданном α определяют интерполяцией.

г) Гипотезу о согласии не отвергают, если $P\{S > S_{\Omega}^*\} = 1 - G(S_{\Omega}^* | H_0) > \alpha$ (или $S_{\Omega}^* < S_{\alpha}$).

3.2.6 Проверка сложных гипотез о согласии с распределениями Джонсона

Проверку сложных гипотез о согласии опытного распределения с теоретическими распределениями Джонсона по критериям типа Колмогорова, типа ω^2 и Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия осуществляют в соответствии с 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 соответственно.

Модели предельных распределений соответствующих статистик выбирают из таблицы А.29 для распределения *Sb*-Джонсона, из таблицы А.30 для распределения *Sl*-Джонсона, из таблицы А.31 для распределения *Su*-Джонсона.

Процентные точки распределений статистики типа Колмогорова представлены в таблице А.32, статистики типа ω^2 Мизеса — в таблице А.33, статистики типа Ω^2 Мизеса — в таблице А.34.

3.2.7 Перечень распределений, для которых регламентирована проверка сложных гипотез с использованием настоящих рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют порядок проверки сложных гипотез о согласии с законами распределения, перечень которых приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Распределение случайной величины	Функция плотности
Экспоненциальное, $x \geq 0$	$\frac{1}{\theta_0} e^{-x/\theta_0}$
Полунормальное, $x \geq 0$	$\frac{2}{\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\theta_0^2}$
Рэля, $x \geq 0$	$\frac{x}{\theta_0^2} e^{-x^2/2\theta_0^2}$
Максвелла, $x \geq 0$	$\frac{2x^2}{\theta_0^3 \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\theta_0^2}$
Лапласа, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{1}{2\theta_0} e^{- x-\theta_1 /\theta_0}$
Нормальное, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{1}{\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_0^2}}$
Логнормальное, $x \in (0, \infty)$	$\frac{1}{x\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-(\ln x - \theta_1)^2/2\theta_0^2}$
Коши, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{\theta_0}{\pi [\theta_0^2 + (x - \theta_1)^2]}$
Логистическое, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{\pi}{\theta_0 \sqrt{3}} \exp \left\{ -\frac{\pi(x - \theta_1)}{\theta_0 \sqrt{3}} \right\} / \left[1 + \exp \left\{ -\frac{\pi(x - \theta_1)}{\theta_0 \sqrt{3}} \right\} \right]^2$
Наибольшего значения, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{1}{\theta_0} \exp \left\{ -\frac{x - \theta_1}{\theta_0} - \exp \left(-\frac{x - \theta_1}{\theta_0} \right) \right\}$
Наименьшего значения, $x \in (-\infty, \infty)$	$\frac{1}{\theta_0} \exp \left\{ \frac{x - \theta_1}{\theta_0} - \exp \left(\frac{x - \theta_1}{\theta_0} \right) \right\}$
Вейбулла, $x \in (0, \infty)$	$\frac{\theta_0 x^{\theta_0 - 1}}{\theta_1^{\theta_0}} \exp \left\{ -\left(\frac{x}{\theta_1} \right)^{\theta_0} \right\}$

Окончание таблицы 1

Распределение случайной величины	Функция плотности
Гамма-распределение, $x \in (\theta_2, \infty)$	$\frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} (x - \theta_2)^{\theta_0 - 1} e^{-(x - \theta_2)/\theta_1}$
<i>Sb</i> -Джонсона, $x \in [\theta_3, \theta_2, +\theta_3]$	$\frac{\theta_1 \theta_2}{\sqrt{2\pi} (x - \theta_3) (\theta_2 + \theta_3 - x)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 - \theta_1 \ln \frac{x - \theta_3}{\theta_2 + \theta_3 - x} \right]^2 \right\}$
<i>Sl</i> -Джонсона, $x \in (\theta_3, \infty)$	$\frac{\theta_1}{\sqrt{2\pi} (x - \theta_3)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 + \theta_1 \ln \frac{x - \theta_3}{\theta_2} \right]^2 \right\}$
<i>Su</i> -Джонсона, $x \in [-\infty, \infty]$	$\frac{\theta_1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{(x - \theta_3)^2 + \theta_2^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 + \theta_1 \ln \left\{ \frac{x - \theta_3}{\theta_2} + \sqrt{\left(\frac{x - \theta_3}{\theta_2} \right)^2 + 1} \right\} \right]^2 \right\}$

Список распределений, приведенный в таблице 1, достаточно ограничен. Он включает в себя законы распределения, наиболее часто используемые в приложениях в качестве моделей законов реальных случайных величин. Более широкий набор параметрических моделей законов распределений предложен в справочнике [35]. В случае необходимости проверки сложной гипотезы относительно закона, не вошедшего в представленный перечень, для построения распределения статистики $G(S|H_0)$, соответствующего проверяемой гипотезе H_0 , рекомендуется воспользоваться методикой компьютерного анализа, изложенной в 2.3.2.

3.2.8 Законы распределения, используемые для аппроксимации предельных распределений статистик непараметрических критериев при проверке сложных гипотез

Эмпирические законы распределения статистик непараметрических критериев согласия наиболее хорошо описываются одним из следующих законов распределения: логарифмически нормальным, гамма-распределением, распределением *Sl*-Джонсона или распределением *Su*-Джонсона.

В таблицах приложения А, содержащих рекомендуемые для использования при проверке сложных гипотез распределения $G(S|H_0)$, через $\ln N(\theta_1, \theta_0)$ обозначено логарифмически нормальное распределение с функцией плотности

$$f(x) = \frac{1}{x\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \theta_1)^2}{2\theta_0^2}},$$

через $\gamma(\theta_0, \theta_1, \theta_2)$ — гамма-распределение с функцией плотности

$$f(x) = \frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} (x - \theta_1)^{\theta_0 - 1} e^{-(x - \theta_1)/\theta_2},$$

через *Sl*($\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$) — распределение *Sl*-Джонсона с плотностью

$$f(x) = \frac{\theta_1}{\sqrt{2\pi} (x - \theta_3)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 + \theta_1 \ln \frac{x - \theta_3}{\theta_2} \right]^2 \right\},$$

через *Su*($\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$) — распределение *Su*-Джонсона с плотностью

$$f(x) = \frac{\theta_1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{(x - \theta_3)^2 + \theta_2^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 + \theta_1 \ln \left\{ \frac{x - \theta_3}{\theta_2} + \sqrt{\left(\frac{x - \theta_3}{\theta_2} \right)^2 + 1} \right\} \right]^2 \right\}.$$

Таблицы А.7 — А.34 построены в результате применения методики компьютерного анализа статистических закономерностей, описанной в 2.3.2.

Процентные точки, представленные в таблицах, соответствуют построенным моделям распределений статистик. В некоторых частных случаях эти значения уточняли вследствие аппроксимации «хвостов» эмпирических распределений, полученных в результате моделирования.

Таблицы А.1 — А.6, используемые при проверке простых гипотез и содержащие значения функций распределения классических статистик непараметрических критериев согласия и значения процентных точек, заимствованы в [3].

3.2.9 Примеры применения критериев согласия при простых и сложных гипотезах

Пример 1 Проверяют простую гипотезу о принадлежности выборки экспоненциальному закону. Упорядоченная выборка объемом 100 наблюдений имеет вид:

0,0041	0,0051	0,0058	0,0074	0,0082
0,0110	0,0160	0,0191	0,0263	0,0279
0,0294	0,0323	0,0411	0,0452	0,0688
0,0741	0,0805	0,0809	0,1026	0,1124
0,1220	0,1226	0,1233	0,1317	0,1323
0,1368	0,1379	0,1475	0,1515	0,1598
0,1710	0,1789	0,2010	0,2014	0,2072
0,2102	0,2194	0,2205	0,2297	0,2300
0,2302	0,2373	0,2375	0,2397	0,2415
0,2492	0,2869	0,2908	0,2976	0,3058
0,3060	0,3073	0,3096	0,3278	0,3553
0,3620	0,3679	0,3833	0,3921	0,3985
0,4078	0,4080	0,4119	0,4169	0,4208
0,4568	0,4707	0,4880	0,4942	0,5214
0,5277	0,5878	0,6146	0,6180	0,6263
0,6415	0,6757	0,7156	0,7157	0,7207
0,7351	0,7485	0,7535	0,7541	0,7728
0,8875	0,9021	0,9581	0,9868	1,0440
1,2226	1,2402	1,2641	1,3034	1,3328
1,3553	1,4006	1,5586	1,6296	2,5018

Проверяемая гипотеза имеет вид $H_0: f(x) = \frac{1}{\theta_0} e^{-x/\theta_0}$ при значении параметра $\theta_0 = 0,5$.

а) Критерий Колмогорова

В соответствии с 3.1.1 вычисляют значение статистики Колмогорова по формуле (6): $S_K^* = 0,8269$. При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 1 - K(S_K^*) = 0,5011$.

б) Критерий Смирнова

В соответствии с 3.1.2 вычисляют значение статистики Смирнова по формуле (12): $S_m^* = 2,7349$.

При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = e^{-S_m^*/2} = 0,2548$.

в) Критерий ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.1.3 вычисляют значение статистики ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\omega^* = 0,1272$.

При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 1 - a1(S_\omega^*) = 0,4673$.

г) Критерий Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.1.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 0,8985$.

При таком значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 1 - a2(S_\Omega^*) = 0,4151$.

Как видно, при задании уровня значимости $\alpha < 0,2548$ (для критерия Смирнова) нет оснований для отклонения проверяемой гипотезы по всем критериям согласия.

Пример 2 Проверяют сложную гипотезу о принадлежности выборки из примера 1 экспоненци-

альному закону $H_0: f(x) \in \left\{ \frac{1}{\theta_0} e^{-x/\theta_0}, \theta_0 \in (0, \infty) \right\}$. Вычисленная по выборке оценка максимального правдоподобия параметра $\hat{\theta}_0 = 0,4465$.

а) Критерий типа Колмогорова

В соответствии с 3.2.1 вычисляют значение статистики типа Колмогорова по формуле (6): $S_K^* = 0,5188$. Из таблицы А.7 находят, что распределение статистики критерия хорошо аппроксимируется логарифмически нормальным распределением $f(x) = \frac{1}{x\theta_0\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln x - \theta_1)^2/2\theta_0^2}$ с параметрами $\theta_0 = 0,2545$; $\theta_1 = -0,3422$. При найденном значении статистики по логарифмически нормальному закону вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 0,8914$.

б) Критерий типа Смирнова

В соответствии с 3.2.2 вычисляют значение статистики типа Смирнова по формуле (12): $S_m^* = 1,0767$. Из таблицы А.11 видно, что распределение статистики критерия аппроксимируется логарифмически нормальным распределением с параметрами $\theta_0 = 0,6951$; $\theta_1 = 0,226$. При найденном значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = 0,5866$.

в) Критерий типа ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.3 вычисляют значение статистики типа ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\omega^* = 0,035$. Из таблицы А.13 видно, что распределение статистики критерия аппроксимируется распределением *Su*-Джонсона с плотностью

$$f(x) = \frac{\theta_1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{(x - \theta_3)^2 + \theta_2^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\theta_0 + \theta_1 \ln \left\{ \frac{x - \theta_3}{\theta_2} + \sqrt{\left(\frac{x - \theta_3}{\theta_2} \right)^2 + 1} \right\} \right]^2 \right\}$$

и параметрами $\theta_0 = -1,8734$; $\theta_1 = 1,2118$; $\theta_2 = 0,0223$; $\theta_3 = 0,024$. При найденном значении статистики по распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 0,9027$.

г) Критерий типа Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 0,386$. Из таблицы А.17 находят, что распределение статистики критерия аппроксимируется распределением *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,8653$; $\theta_1 = 1,422$; $\theta_2 = 0,105$; $\theta_3 = 0,1128$. При найденном значении статистики по распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 0,6808$.

По всем критериям согласие выборки с экспоненциальным законом очень хорошее.

Пример 3 Проверяют простую гипотезу о принадлежности выборки нормальному закону. Упорядоченная выборка объемом 100 наблюдений имеет вид:

−0,6679	−0,4652	0,0056	0,0078	0,0167
0,0362	0,1189	0,1556	0,1831	0,2037
0,2829	0,2852	0,3388	0,4264	0,4733
0,4999	0,5093	0,5181	0,5227	0,5281
0,5506	0,5679	0,5849	0,5872	0,6027
0,6052	0,6124	0,6342	0,6616	0,6669
0,6712	0,7245	0,7386	0,7567	0,7992
0,8045	0,8083	0,8151	0,8216	0,8422
0,8472	0,8502	0,8678	0,8699	0,8902
0,8918	0,9037	0,9443	0,9529	0,9535
0,9548	0,9557	0,9632	0,9767	0,9956
0,9992	1,0233	1,0257	1,0574	1,0621
1,0658	1,0706	1,0724	1,1059	1,1172

1,1447	1,1500	1,1595	1,1836	1,1875
1,1887	1,2143	1,2360	1,2589	1,2754
1,2998	1,3192	1,3288	1,3587	1,3818
1,3998	1,4088	1,4314	1,4337	1,4822
1,4832	1,4958	1,4968	1,5213	1,5249
1,5896	1,6087	1,6425	1,6554	1,6687
1,8223	1,8569	1,8886	2,0460	2,2956

Проверяемая гипотеза имеет вид $H_0: f(x) = \frac{1}{\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_0^2}}$ при значении параметра $\theta_0 = 0,5$;

$\theta_1 = 1$.

а) Критерий Колмогорова

В соответствии с 3.1.1 вычисляют значение статистики Колмогорова по формуле (6):

$S_K^* = 0,7410$. При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 1 - K(S_K^*) = 0,5741$.

б) Критерий Смирнова

В соответствии с 3.1.2 вычисляют значение статистики Смирнова по формуле (12): $S_m^* = 2,1964$.

При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = e^{-S_m^*/2} = 0,3335$.

в) Критерий ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.1.3 вычисляют значение статистики ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\omega^* = 0,1148$.

При этом значении статистики вычисляют вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 1 - a1(S_\omega^*) = 0,5169$.

г) Критерий Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.1.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 0,7577$.

Полученная при таком значении статистики вероятность равна 0,5126.

Как видно, при задании уровня значимости $\alpha < 0,3335$ (для критерия Смирнова) нет оснований для отклонения проверяемой гипотезы по всем критериям согласия.

Пример 4 Проверяют сложную гипотезу о принадлежности выборки из примера 3 нормальному закону распределения. Проверяемая гипотеза имеет вид $H_0: f(x) \in \left\{ \frac{1}{\theta_0 \sqrt{2\pi}} e^{-(x-\theta_1)^2/2\theta_0^2}, \right.$

$\left. \theta_0 \in (0, \infty), \theta_1 \in (-\infty, \infty) \right\}$. Вычисленные по выборке оценки максимального правдоподобия парамет-

ров $\hat{\theta}_0 = 0,4465$; $\hat{\theta}_1 = 0,9369$.

а) Критерий типа Колмогорова

В соответствии с 3.2.1 вычисляют значение статистики типа Колмогорова по формуле (6):

$S_K^* = 0,5741$. Из таблицы А.7 находят, что распределение статистики критерия при вычислении оценок максимального правдоподобия двух параметров нормального закона аппроксимируется гамма-распределением $f(x) = \frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} (x-\theta_2)^{\theta_0-1} e^{-(x-\theta_2)/\theta_1}$ с параметрами $\theta_0 = 4,9014$; $\theta_1 = 0,0691$;

$\theta_2 = 0,2951$. При найденном значении статистики по гамма-распределению вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 0,6034$.

б) Критерий типа Смирнова

В соответствии с 3.2.2 вычисляют значение статистики типа Смирнова по формуле (12): $S_m^* = 0,4016$. Из таблицы А.11 видно, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП двух параметров нормального закона подчиняется логарифмически нормальному распределению с

параметрами $\theta_0 = 0,5436$; $\theta_1 = 0,1164$. При найденном значении статистики вычисляют по логарифмически нормальному закону вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = 0,9708$.

в) Критерий типа ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.3 вычисляют значение статистики типа ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\omega^* = 0,0338$. Из таблицы А.13 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП двух параметров нормального закона подчиняется логарифмически нормальному распределению с параметрами $\theta_0 = 0,5330$; $\theta_1 = -2,9794$. При найденном значении статистики вычисляют по логарифмически нормальному закону вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 0,7779$.

г) Критерий типа Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 0,2394$. Из таблицы А.17 находят, что распределение статистики критерия подчиняется распределению Си-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,7057$; $\theta_1 = 1,7154$; $\theta_2 = 0,1043$; $\theta_3 = 0,0925$. При найденном значении статистики по распределению Си-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 0,7719$.

По всем критериям согласие выборки с нормальным законом очень хорошее.

Пример 5 Проверяют сложную гипотезу о принадлежности выборки двухпараметрическому распределению Вейбулла. Упорядоченная выборка объемом 200 наблюдений имеет вид:

0,0999	0,1089	0,1134	0,1160	0,1242
0,1332	0,1356	0,1442	0,1575	0,1819
0,1853	0,1922	0,2071	0,2141	0,2184
0,2244	0,2475	0,2485	0,2551	0,2572
0,2634	0,2642	0,2647	0,2659	0,2668
0,2726	0,2768	0,2796	0,2824	0,2844
0,2858	0,2897	0,2918	0,2957	0,3090
0,3151	0,3151	0,3152	0,3181	0,3187
0,3208	0,3241	0,3305	0,3380	0,3396
0,3398	0,3405	0,3417	0,3441	0,3533
0,3547	0,3548	0,3663	0,3671	0,3734
0,3781	0,3870	0,3918	0,3940	0,3980
0,3988	0,4032	0,4070	0,4110	0,4219
0,4234	0,4236	0,4257	0,4282	0,4305
0,4320	0,4535	0,4599	0,4611	0,4632
0,4739	0,4821	0,4862	0,4885	0,4899
0,5089	0,5106	0,5285	0,5338	0,5361
0,5374	0,5399	0,5505	0,5537	0,5685
0,5716	0,5717	0,5730	0,5821	0,5834
0,5999	0,6010	0,6054	0,6097	0,6120
0,6142	0,6151	0,6252	0,6259	0,6315
0,6354	0,6377	0,6423	0,6520	0,6553
0,6758	0,6853	0,6862	0,6943	0,6987
0,7095	0,7114	0,7140	0,7157	0,7355
0,7479	0,7624	0,7738	0,7748	0,7820
0,7849	0,7915	0,8013	0,8099	0,8111
0,8184	0,8234	0,8250	0,8260	0,8284
0,8295	0,8473	0,8478	0,8480	0,8493
0,8620	0,8706	0,8713	0,8834	0,8846
0,9073	0,9076	0,9128	0,9272	0,9500
0,9589	0,9608	0,9890	0,9922	1,0176
1,0184	1,0287	1,0368	1,0533	1,0538
1,1193	1,1245	1,1245	1,1346	1,1399
1,1485	1,1574	1,1591	1,1669	1,1701
1,2342	1,2618	1,2679	1,3034	1,3503

1,4257	1,4258	1,4501	1,4617	1,4632
1,4785	1,5091	1,5188	1,5752	1,6154
1,6333	1,6355	1,7139	1,7503	1,7684
1,9291	2,0316	2,0937	2,0948	2,3901
2,5209	2,8097	3,0380	3,0530	6,1251

Проверяют $H_0: f(x) \in \left\{ \frac{\theta_0 x^{\theta_0 - 1}}{\theta_1^{\theta_0}} \exp\{-(x / \theta_1)^{\theta_0}\}, \theta_0 \in (0, \infty), \theta_1 \in (0, \infty) \right\}$. Вычисленные по выбор-

ке оценки максимального правдоподобия параметров $\hat{\theta}_0 = 1,3734; \hat{\theta}_1 = 0,8539$.

а) Критерий типа Колмогорова

В соответствии с 3.2.1 вычисляют значение статистики типа Колмогорова по формуле (6):

$S_K^* = 1,2402$. Из таблицы А.7 находят, что распределение статистики критерия при вычислении оценок максимального правдоподобия двух параметров распределения Вейбулла аппроксимируется гамма-распределением с параметрами $\theta_0 = 4,9738; \theta_1 = 0,066; \theta_2 = 0,3049$. При найденном значении статистики в соответствии с гамма-распределением вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 0,00154$. Следовательно, при задании уровня значимости $\alpha > 0,00154$ проверяемая гипотеза должна быть отклонена.

б) Критерий типа Смирнова

В соответствии с 3.2.2 вычисляют значение статистики типа Смирнова по формуле (12):

$S_m^* = 4,6028$. Из таблицы А.11 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП двух параметров распределения Вейбулла подчиняется логарифмически нормальному распределению с параметрами $\theta_0 = 0,1501; \theta_1 = 0,5108$. При найденном значении статистики вычисляют в соответствии с логарифмически нормальным законом вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = 0,00352$.

в) Критерий типа ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.3 вычисляют значение статистики типа ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\omega^* = 0,347$. Из таблицы А.13 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП двух параметров распределения Вейбулла подчиняется логарифмически нормальному распределению с параметрами $\theta_0 = 0,5379; \theta_1 = -2,9541$. При найденном значении статистики вычисляют в соответствии с логарифмически нормальным законом вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 0,00021$

г) Критерий типа Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 2,553$.

Из таблицы А.17 находят, что при вычислении ОМП двух параметров распределения Вейбулла распределение статистики критерия хорошо аппроксимируется распределением *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,4622; \theta_1 = 1,6473; \theta_2 = 0,1075; \theta_3 = 0,1149$. При найденном значении статистики вычисляют по распределению *Su*-Джонсона вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 0,000066$.

Таким образом, по всем критериям выборка плохо согласуется с распределением Вейбулла и проверяемая гипотеза должна быть отклонена.

Пример 6 Проверяют сложную гипотезу о принадлежности выборки гамма-распределению с параметром формы $\theta_0 = 2$, параметром сдвига $\theta_2 = 0$. Упорядоченная выборка объемом 100 наблюдений имеет вид:

0,1006	0,2156	0,2311	0,2925	0,3410
0,3512	0,4028	0,5132	0,5340	0,5409
0,6100	0,6187	0,6204	0,6324	0,6559
0,6743	0,7131	0,7394	0,7779	0,7911
0,7919	0,8068	0,8117	0,8839	0,8996
0,9040	0,9167	0,9210	0,9441	0,9487
1,0274	1,0285	1,0316	1,1102	1,1249

1,1302	1,1497	1,2345	1,2530	1,2903
1,3136	1,3303	1,3360	1,3405	1,3804
1,4050	1,4117	1,4331	1,4617	1,4991
1,5852	1,6111	1,6175	1,6299	1,6798
1,7159	1,7287	1,7756	1,8505	1,8872
1,8928	1,9605	2,0299	2,1560	2,2548
2,2769	2,2901	2,3020	2,4111	2,4679
2,5302	2,5342	2,6717	2,6789	2,6797
2,8988	2,9230	2,9414	2,9558	3,0030
3,0531	3,1134	3,2002	3,2757	3,3716
3,4342	3,4632	3,5365	3,5753	3,7399
3,9758	4,1776	4,3462	4,3627	4,5000
4,5506	4,7544	4,7859	5,6662	8,2201

Проверяемая гипотеза имеет вид

$$H_0: f(x) \in \left\{ \frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} (x - \theta_2)^{\theta_0 - 1} e^{-(x - \theta_2)/\theta_1}, \theta_0 = 2, \theta_1 \in (0, \infty), \theta_2 = 0 \right\}.$$

Вычисленная по выборке оценка максимального правдоподобия параметра масштаба $\hat{\theta}_1 = 1,02818$.

а) Критерий типа Колмогорова

В соответствии с 3.2.5.1 вычисляют значение статистики типа Колмогорова по формуле (6):

$S_K^* = 0,4917$. Из таблицы А.21 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП масштабного параметра гамма-распределения подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,2691$; $\theta_1 = 2,2383$; $\theta_2 = 0,2323$; $\theta_3 = 0,3958$. При найденном значении статистики по распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 0,9146$. Следовательно, согласие очень хорошее и проверяемая гипотеза должна быть принята.

б) Критерий типа Смирнова

В соответствии с 3.2.5.2 вычисляют значение статистики типа Смирнова по формуле (12):

$S_m^* = 0,9419$. Из таблицы А.23 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметра масштаба гамма-распределения подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,5372$; $\theta_1 = 1,3749$; $\theta_2 = 0,3464$; $\theta_3 = 0,2162$. При найденном значении статистики по распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_m > S_m^*\} = 0,6897$, значение которой указывает на хорошее согласие.

в) Критерий типа ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.5.3 вычисляют значение статистики типа ω^2 Мизеса по формуле (16):

$S_\omega^* = 0,0475$. Из таблицы А.25 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметра масштаба гамма-распределения подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -1,6042$; $\theta_1 = 1,1125$; $\theta_2 = 0,0027$; $\theta_3 = 0,0281$. При найденном значении статистики по распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} = 0,7498$.

г) Критерий типа Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.5.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16):

$S_\Omega^* = 0,2675$. Из таблицы А.27 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметра масштаба гамма-распределения подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,4667$; $\theta_1 = 1,418$; $\theta_2 = 0,1207$; $\theta_3 = 0,1416$. При найденном значении статистики по данному распределению *Su*-Джонсона вычисляют вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} = 0,8798$.

Таким образом, по всем критериям выборка хорошо согласуется с гамма-распределением и проверяемая гипотеза должна быть принята.

Пример 7 Проверяют сложную гипотезу о принадлежности выборки гамма-распределению с параметром сдвига $\theta_2 = 0$. Упорядоченная выборка объемом 100 наблюдений имеет вид:

0,0002	0,0004	0,0009	0,0019	0,0020
0,0025	0,0028	0,0030	0,0031	0,0040
0,0044	0,0054	0,0057	0,0068	0,0076
0,0081	0,0084	0,0090	0,0101	0,0119
0,0130	0,0162	0,0190	0,0201	0,0206
0,0237	0,0293	0,0312	0,0427	0,0431
0,0441	0,0452	0,0481	0,0492	0,0498
0,0517	0,0517	0,0552	0,0558	0,0638
0,0671	0,0714	0,0806	0,0815	0,0965
0,0987	0,1005	0,1055	0,1255	0,1307
0,1312	0,1324	0,1353	0,1411	0,1446
0,1524	0,1594	0,1678	0,1754	0,1767
0,1799	0,1838	0,1994	0,2116	0,2159
0,2162	0,2238	0,2242	0,2329	0,2545
0,2782	0,2900	0,2929	0,2967	0,3006
0,3084	0,3200	0,3262	0,3286	0,3473
0,3488	0,3608	0,3905	0,3961	0,4132
0,4294	0,4385	0,4557	0,4629	0,4699
0,5041	0,5096	0,6121	0,6146	0,6415
0,7359	0,9762	1,1460	1,1494	1,6170

Проверяемая гипотеза имеет вид

$$H_0: f(x) \in \left\{ \frac{1}{\theta_1^{\theta_0} \Gamma(\theta_0)} (x - \theta_2)^{\theta_0 - 1} e^{-(x - \theta_2)/\theta_1}, \theta_0 \in (0, \infty), \theta_1 \in (0, \infty), \theta_2 = 0 \right\}.$$

Вычисленные по выборке ОМП параметров формы и масштаба соответственно равны $\hat{\theta}_0 = 0,5812$; $\hat{\theta}_1 = 2,7391$. В таблицах А.21 — А.28 ближайшее значение параметра формы $\theta_0 = 0,5$.

а) Критерий типа Колмогорова

В соответствии с 3.2.5.1 вычисляют значение статистики типа Колмогорова по формуле (6):

$S_K^* = 0,6272$. Из таблицы А.21 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметров формы и масштаба гамма-распределения при $\theta_0 = 0,5$ подчиняется распределению *Си-Джонсона* с параметрами $\theta_0 = -2,8715$; $\theta_1 = 2,5280$; $\theta_2 = 0,2325$; $\theta_3 = 0,3296$. При найденном значении статистики по данному распределению *Си-Джонсона* вычисляют вероятность $P\{S > S_K^*\} = 0,5699$. Так как оценка параметра формы больше 0,5, то при $\hat{\theta}_0 = 0,5812$ $P\{S > S_K^*\} > 0,5699$. Следовательно, проверяемая гипотеза должна быть принята.

б) Критерий типа Смирнова

В соответствии с 3.2.5.2 вычисляют значение статистики типа Смирнова по формуле (12):

$S_m^* = 1,1526$. Из таблицы А.23 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметров формы и масштаба гамма-распределения при $\theta_0 = 0,5$ подчиняется распределению *Си-Джонсона* с параметрами $\theta_0 = -2,4027$; $\theta_1 = 1,3861$; $\theta_2 = 0,3389$; $\theta_3 = 0,2290$. При найденном значении статистики по данному распределению *Си-Джонсона* вычисляют, что вероятность $P\{S_m > S_m^*\} > 0,5031$.

в) Критерий типа ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.5.3 вычисляют значение статистики типа ω^2 Мизеса по формуле (16):

$S_\omega^* = 0,0561$. Из таблицы А.25 находят, что распределение статистики критерия при вычислении

ОМП параметров формы и масштаба гамма-распределения при $\theta_0 = 0,5$ подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -1,5811$; $\theta_1 = 1,1193$; $\theta_2 = 0,0164$; $\theta_3 = 0,0243$. При найденном значении статистики по данному распределению *Su*-Джонсона вычисляют, что вероятность $P\{S_\omega > S_\omega^*\} > 0,4985$.

г) Критерий типа Ω^2 Мизеса

В соответствии с 3.2.5.4 вычисляют значение статистики Ω^2 Мизеса по формуле (16): $S_\Omega^* = 0,3746$. Из таблицы А.27 находят, что распределение статистики критерия при вычислении ОМП параметров формы и масштаба гамма-распределения при $\theta_0 = 0,5$ подчиняется распределению *Su*-Джонсона с параметрами $\theta_0 = -2,6917$; $\theta_1 = 1,6334$; $\theta_2 = 0,0970$; $\theta_3 = 0,1067$. При найденном значении статистики по данному распределению *Su*-Джонсона вычисляют, что вероятность $P\{S_\Omega > S_\Omega^*\} > 0,4400$.

Таким образом, по всем критериям выборка хорошо согласуется с гамма-распределением и проверяемая гипотеза должна быть принята.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ТАБЛИЦЫ

**распределений статистик непараметрических критериев согласия
при простых и сложных гипотезах**

Т а б л и ц а А.1 — Функция распределения статистики Колмогорова $K(S)$ при проверке простой гипотезы

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,2	0,000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000001	000004
0,3	0,000009	000021	000046	000091	000171	000303	000511	000826	001285	001929
0,4	0,002808	003972	005476	007377	009730	012589	016005	020022	024682	030017
0,5	0,036055	042814	050306	058534	067497	077183	087577	098656	110394	122760
0,6	0,135718	149229	163255	177752	192677	207987	223637	239582	255780	272188
0,7	0,288765	305471	322265	339114	355981	372833	389640	406372	423002	439505
0,8	0,455858	472039	488028	503809	519365	534682	549745	564545	579071	593315
0,9	0,607269	620928	634285	647337	660081	672515	684836	696445	707941	719126
1,0	0,730000	740566	750825	760781	770436	779794	788860	797637	806130	814343
1,1	0,822282	829951	837356	844502	851395	858040	864443	870610	876546	882258
1,2	0,887750	893030	898102	903973	907648	912134	916435	920557	924506	928288
1,3	0,931908	935371	938682	941847	944871	947758	950514	953144	955651	958041
1,4	0,960318	962487	964551	966515	968383	970159	971846	973448	974969	976413
1,5	0,977782	979080	980310	981475	982579	983623	984610	985544	986427	987261
1,6	0,988048	988791	989492	990154	990777	991364	991917	992438	992928	993389
1,7	0,993823	994230	994612	994972	995309	995625	995922	996200	996460	996704
1,8	0,996932	997146	997346	997533	997707	997870	998023	998165	998297	998421
1,9	0,998536	998644	998744	998837	998924	999004	999079	999149	999213	999273
2,0	0,999329	999381	999429	999473	999514	999553	999588	999620	999651	999679
2,1	0,999705	999728	999750	999771	999790	999807	999823	999837	999851	999863
2,2	0,999874	999886	999895	999904	999912	999920	999927	999933	999939	999944
2,3	0,999949	999954	999958	999961	999965	999968	999971	999974	999976	999978
2,4	0,999980	999982	999984	999985	999987	999988	999989	999990	999991	999992

Т а б л и ц а А.2 — Процентные точки распределения статистики Колмогорова при проверке простой гипотезы

Функция распределения	Верхние процентные точки				
	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
$K(S)$	1,1379	1,2238	1,3581	1,4802	1,6276

Т а б л и ц а А.3 — Функция распределения статистики ω^2 Мизеса $a1(S)$ при проверке простой гипотезы

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00001	00300	02568	06685	12372	18602	24844	30815	36386
0,1	0,41513	46196	50457	54329	57846	61042	63951	66600	69019	71229
0,2	0,73253	75109	76814	78383	79829	81163	82396	83536	84593	85573
0,3	0,86483	87329	88115	88848	89531	90167	90762	91317	91836	92321
0,4	0,92775	93201	93599	93972	94323	94651	94960	95249	95521	95777
0,5	0,96017	96242	96455	96655	96843	97020	97186	97343	97491	97630
0,6	0,97762	97886	98002	98112	98216	98314	98406	98493	98575	98653
0,7	0,98726	98795	98861	98922	98981	99036	99088	99137	99183	99227
0,8	0,99268	99308	99345	99380	99413	99444	99474	99502	99528	99553
0,9	0,99577	99599	99621	99641	99660	99678	99695	99711	99726	99740
1,0	0,99754	99764	99776	99787	99799	99812	99820	99828	99837	99847
1,1	0,99856	99862	99869	99876	99883	99890	99895	99900	99905	99910
1,2	0,99916	99919	99923	99927	99931	99935	99938	99941	99944	99947
1,3	0,99950	99953	99955	99957	99959	99962	99964	99965	99967	99969
1,4	0,99971	99972	99973	99975	99976	99978	99978	99979	99980	99980

Т а б л и ц а А.4 — Процентные точки распределения статистики ω^2 Мизеса при проверке простой гипотезы

Функция распределения	Верхние процентные точки				
	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
$a1(S)$	0,2841	0,3473	0,4614	0,5806	0,7434

Т а б л и ц а А.5 — Функция распределения статистики Ω^2 Мизеса (Андерсона — Дарлингга) $a2(S)$ при проверке простой гипотезы

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00001
0,1	0,00003	00008	00020	00043	00081	00141	00228	00349	00508	00710
0,2	0,00959	01256	01605	02005	02457	02961	03514	04115	04762	05453
0,3	0,06184	06954	07759	08596	09463	10356	11273	12211	13168	14140
0,4	0,15127	16124	17132	18146	19166	20190	21217	22244	23271	24296
0,5	0,25319	26337	27351	28359	29360	30355	31342	32320	33290	34250
0,6	0,35200	36141	37071	37991	38900	39798	40684	41560	42424	43277
0,7	0,44118	44947	45765	46572	47367	48150	48922	49683	50432	51170
0,8	0,51897	52613	53318	54012	54695	55368	56030	56682	57324	57956
0,9	0,58577	59189	59791	60383	60966	61540	62104	62660	63206	63744
1,0	0,64273	64794	65306	65811	66307	66795	67275	67748	68213	68670
1,1	0,69120	69563	69999	70428	70851	71266	71675	72077	72473	72863
1,2	0,73247	73624	73996	74361	74721	75075	75424	75767	76105	76438
1,3	0,76765	77088	77405	77717	78025	78328	78626	78919	79209	79493

Окончание таблицы А.5

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,4	0,79773	80049	80321	80589	80852	81112	81368	81620	81868	82112
1,5	0,82352	82589	82823	83053	83279	83503	83723	83939	84153	84363
1,6	0,84570	84774	84975	85173	85369	85561	85751	85938	86122	86303
1,7	0,86482	86659	86832	87004	87173	87339	87503	87665	87824	87981
1,8	0,88136	88289	88439	88588	88734	88878	89021	89161	89299	89435
1,9	0,89570	89703	89833	89962	90089	90215	90338	90460	90581	90699
2,0	0,90816	90932	91046	91158	91269	91378	91486	91592	91697	91800
2,1	0,91902	92003	92102	92200	92297	92392	92486	92579	92671	92761
2,2	0,92851	92939	93025	93111	93196	93279	93361	93443	93523	93602
2,3	0,93680	93757	93833	93908	93983	94056	94128	94199	94269	94339
2,4	0,94407	94475	94542	94608	94673	94737	94800	94863	94925	94986
2,5	0,95046	95105	95164	95222	95279	95336	95391	95446	95501	95554
2,6	0,95607	95660	95711	95762	95813	95862	95912	95960	96008	96055
2,7	0,96102	96148	96194	96239	96283	96327	96370	96413	96455	96497
2,8	0,96538	96579	96619	96659	96698	96737	96775	96813	96850	96887
2,9	0,96923	96959	96995	97030	97064	97099	97132	97166	97199	97231
3,0	0,97263	97295	97327	97358	97388	97419	97449	97478	97507	97536
3,1	0,97565	97593	97621	97648	97675	97702	97729	97755	97781	97806
3,2	0,97831	97856	97881	97905	97929	97953	97977	98000	98023	98046
3,3	0,98068	98090	98112	98134	98155	98176	98197	98217	98238	98258
3,4	0,98278	98297	98317	98336	98355	98374	98392	98410	98429	98447
3,5	0,98464	98482	98499	98516	98533	98549	98566	98582	98598	98614
3,6	0,98630	98645	98660	98676	98691	98705	98720	98734	98749	98763
3,7	0,98777	98791	98804	98818	98831	98844	98857	98870	98883	98895
3,8	0,98908	98920	98932	98944	98956	98968	98979	98991	99002	99013
3,9	0,99024	99035	99046	99057	99067	99078	99088	99098	99108	99118
4,0	0,99128	99221	99303	99377	99442	99501	99553	99600	99642	99679
5,0	0,99713	99742	99769	99793	99814	99834	99851	99866	99880	99892
6,0	0,99903	99913	99922	99930	99937	99944	99949	99954	99959	99963
7,0	0,99967	99970	99973	99976	99978	99981	99983	99984	99986	99987
8,0	0,99989	99990	99991	99992	99993	99993	99994	99995	99995	99996
9,0	0,99996	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Т а б л и ц а А.6 — Процентные точки распределения статистики Ω^2 Мизеса (Андерсона — Дарлинг) при проверке простой гипотезы

Функция распределения	Верхние процентные точки				
	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
$\alpha^2(S)$	1,6212	1,9330	2,4924	3,0775	3,8781

Т а б л и ц а А.7 — Аппроксимация предельных распределений статистики Колмогорова при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	$\ln N (-0,3422; 0,2545)$	—	—
Полунормальное	$\gamma(4,1332; 0,1076; 0,3205)$	—	—
Рэля	$\ln N (-0,3388; 0,2621)$	—	—
Максвелла	$\ln N (-0,3461; 0,2579)$	—	—
Лапласа	$\gamma(4,0038; 0,1269; 0,3163)$	$\gamma(4,6474; 0,0870; 0,3091)$ $\ln N (-0,3690; 0,2499)$	$\gamma(4,4525; 0,0761; 0,3252)$ $\ln N (-0,4358; 0,2276)$
Нормальное	$\gamma(4,1492; 0,1259; 0,3142)$	$\ln N (-0,4138; 0,2289)$	$\gamma(4,9014; 0,0691; 0,2951)$ $\ln N (-0,4825; 0,2296)$
Логнормальное	$\gamma(4,3376; 0,1265; 0,2890)$	$Su(-2,0328; 2,3642; 0,2622; 0,4072)$	$Su(-1,8093; 1,9041; 0,1861; 0,4174)$
Коши	$Su (-3,3278; 2,2529; 0,2185; 0,2858)$	$\gamma(4,8247; 0,0874; 0,2935)$	$\ln N (-0,5302; 0,2427)$
Логистическое	$\gamma(3,5345; 0,1385; 0,339)$	$Su(-2,8534; 3,0657; 0,2872; 0,3199)$	$\ln N (-0,5611; 0,2082)$
Наибольшего значения	$\gamma(3,4689; 0,1384; 0,3543)$	$\gamma(4,1008; 0,0997; 0,3269)$	$\gamma(4,9738; 0,0660; 0,3049)$
Наименьшего значения	$\gamma(3,4689; 0,1384; 0,3543)$	$\gamma(4,1008; 0,0997; 0,3269)$	$\gamma(4,9738; 0,0660; 0,3049)$
Вейбулла	$\gamma(3,4689; 0,1384; 0,3543)^1)$	$\gamma(4,1008; 0,0997; 0,3269)^2)$	$\gamma(4,9738; 0,0660; 0,3049)$

¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла.
²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.

Т а б л и ц а А.8 — Процентные точки распределения статистики Колмогорова при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,9246	0,9841	1,0794	1,1695	1,2838
Полунормальное	Масштабный	0,9857	1,0584	1,1752	1,2853	1,4241
Рэля	Масштабный	0,9338	0,9954	1,0944	1,1881	1,3072
Максвелла	Масштабный	0,9242	0,9845	1,0812	1,1728	1,2890
Лапласа	Масштабный	1,0800	1,1647	1,3009	1,4296	1,5918
	Сдвиг	0,9015	0,9612	1,0547	1,1426	1,2538
	Два параметра	0,8216	0,8710	0,9497	1,0248	1,1206
Нормальное	Масштабный	1,0951	1,1803	1,3171	1,4462	1,6087
	Сдвиг	0,8381	0,8865	0,9634	1,0354	1,1260
	Два параметра	0,7895	0,8333	0,9042	0,9723	1,0599
Логнормальное	Масштабный	1,1037	1,1907	1,3303	1,4618	1,6272
	Сдвиг	0,8516	0,9076	1,0006	1,0927	1,2151
	Два параметра	0,8113	0,8708	0,9731	1,0782	1,2234
Коши	Масштабный	1,0281	1,1169	1,2669	1,4176	1,6209
	Сдвиг	0,9096	0,9722	1,0723	1,1663	1,2842
	Два параметра	0,7568	0,8032	0,8772	0,9469	1,0350

Окончание таблицы А.8

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Логистическое	Масштабный	1,0895	1,1777	1,3201	1,4552	1,6262
	Сдвиг	0,7903	0,8359	0,9096	0,9803	1,0713
	Два параметра	0,7080	0,7451	0,8036	0,8581	0,9261
Наибольшего значения	Масштабный	1,0925	1,1800	1,3215	1,4557	1,6257
	Сдвиг	0,9391	1,0062	1,1141	1,2159	1,3442
	Два параметра	0,7825	0,8304	0,9069	0,9786	1,0684
Наименьшего значения	Масштабный	1,0925	1,1800	1,3215	1,4557	1,6257
	Сдвиг	0,9391	1,0062	1,1141	1,2159	1,3442
	Два параметра	0,7825	0,8304	0,9069	0,9786	1,0684
Вейбулла	Формы	1,0925	1,1800	1,3215	1,4557	1,6257
	Масштаба	0,9391	1,0062	1,1141	1,2159	1,3442
	Два параметра	0,7825	0,8304	0,9069	0,9786	1,0684

Т а б л и ц а А.9 — Аппроксимация предельных распределений минимума статистики Колмогорова (при использовании MD -оценок, минимизирующих статистику S_K)

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	$\gamma(4,4983; 0,0621; 0,2891)$	—	—
Полунормальное	$\gamma(4,2884; 0,0705; 0,3072)$	—	—
Рэлея	$\gamma(4,8579; 0,0639; 0,2900)$	—	—
Максвелла	$\gamma(5,3106; 0,0581; 0,2865)$	—	—
Лапласа	$\gamma(3,0431; 0,1355; 0,3182)$	$\gamma(5,0103; 0,0602; 0,2968)$ $\ln N(-0,5358; 0,2122)$	$Su(-2,1079; 2,4629; 0,1661; 0,3340)$ $\ln N(-0,6970; 0,1952)$
Нормальное	$\gamma(3,2458; 0,1343; 0,3072)$	$\ln N(-0,5469; 0,2152)$	$\ln N(-0,7236; 0,1837)$
Логнормальное	$\gamma(3,2458; 0,1343; 0,3072)$	$\ln N(-0,5469; 0,2152)$	$\ln N(-0,7236; 0,1837)$
Коши	$\gamma(3,4398; 0,1255; 0,3022)$	$\ln N(-0,5182; 0,2268)$	$Su(-1,6929; 2,5234; 0,1892; 0,3607)$ $\ln N(-0,6946; 0,1938)$
Логистическое	$Su(-2,6522; 1,8288; 0,1738; 0,3384)$ $\gamma(3,6342; 0,1284; 0,2772)$	$Su(-3,8497; 3,2770; 0,2136; 0,2607)$ $\ln N(-0,5511; 0,2045)$	$\ln N(-0,7389; 0,1771)$ $Su(-2,5093; 3,1277; 0,1932; 0,3041)$
Наибольшего значения	$\gamma(3,5424; 0,1203; 0,2975)$	$Su(-1,9028; 2,3972; 0,2227; 0,389)$	$Su(-1,3144; 2,2480; 0,1616; 0,3858)$ $\ln N(-0,7174; 0,1841)$
Наименьшего значения	$\gamma(3,5424; 0,1203; 0,2975)$	$Su(-1,9028; 2,3972; 0,2227; 0,389)$	$Su(-1,3144; 2,2480; 0,1616; 0,3858)$ $\ln N(-0,7174; 0,1841)$
Вейбулла	$\gamma(3,5424; 0,1203; 0,2975)^1$	$Su(-1,9028; 2,3972; 0,2227; 0,389)^2$	$Su(-1,3144; 2,2480; 0,1616; 0,3858)$ $\ln N(-0,7174; 0,1841)$

¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла.

²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.

Т а б л и ц а А.10 — Процентные точки распределения минимума статистики Колмогорова (при использовании *MD*-оценок, минимизирующих статистику S_K)

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,7016	0,7449	0,8143	0,8796	0,9617
Полунормальное	Масштабный	0,7569	0,8052	0,8826	0,9557	1,0476
Рэлея	Масштабный	0,7429	0,7888	0,8622	0,9310	1,0174
Максвелла	Масштабный	0,7308	0,7740	0,8429	0,9073	0,9879
Лапласа	Масштабный	0,9660	1,0477	1,1803	1,3067	1,4674
	Сдвиг	0,7353	0,7791	0,8490	0,9145	0,9967
	Два параметра	0,6085	0,6419	0,6970	0,7512	0,8229
Нормальное	Масштабный	0,9847	1,0676	1,2018	1,3295	1,4915
	Сдвиг	0,7234	0,7625	0,8245	0,8824	0,9548
	Два параметра	0,5867	0,6137	0,6561	0,6952	0,7436
Логнормальное	Масштабный	0,9847	1,0676	1,2018	1,3295	1,4915
	Сдвиг	0,7234	0,7625	0,8245	0,8824	0,9548
	Два параметра	0,5867	0,6137	0,6561	0,6952	0,7436
Коши	Масштабный	0,9669	1,0460	1,1739	1,2953	1,4491
	Сдвиг	0,7534	0,7965	0,8649	0,9290	1,0095
	Два параметра	0,6076	0,6391	0,6906	0,7408	0,8067
Логистическое	Масштабный	0,9971	1,0807	1,2336	1,3532	1,4876
	Сдвиг	0,7110	0,7496	0,8119	0,8714	0,9477
	Два параметра	0,5739	0,5993	0,6392	0,6758	0,7212
Наибольшего значения	Масштабный	0,9505	1,0272	1,1510	1,2684	1,4170
	Сдвиг	0,7358	0,7798	0,8528	0,9246	1,0199
	Два параметра	0,5874	0,6168	0,6656	0,7138	0,7780
Наименьшего значения	Масштабный	0,9505	1,0272	1,1510	1,2684	1,4170
	Сдвиг	0,7358	0,7798	0,8528	0,9246	1,0199
	Два параметра	0,5874	0,6168	0,6656	0,7138	0,7780
Вейбулла	Формы	0,9505	1,0272	1,1510	1,2684	1,4170
	Масштаба	0,7358	0,7798	0,8528	0,9246	1,0199
	Два параметра	0,5874	0,6168	0,6656	0,7138	0,7780

Т а б л и ц а А.11 — Аппроксимация предельных распределений статистики Смирнова при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	$\ln N(0,2260; 0,6951)$	—	—
Полунормальное	$\ln N(0,2050; 0,7718)$	—	—
Рэлея	$\ln N(0,2248; 0,7248)$	—	—
Максвелла	$\ln N(0,2462; 0,6779)$	—	—
Лапласа	$\gamma(0,8539; 1,9952; 0,0000)$	$\gamma(1,7941; 0,8324; 0,0149)$	$\gamma(1,7071; 0,7234; 0,0170)$

Окончание таблицы А.11

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Нормальное	$\gamma(0,8700; 2,0786; 0,0004)$	$\gamma(2,6428; 0,5089; 0,2056)$ $\ln N(0,2992; 0,5298)$	$\ln N(0,1164; 0,5436)$
Логнормальное	$\gamma(0,8231; 2,1973; 0,0001)$	$Su(-2,5588; 1,6251; 0,4763; 0,2134)$	$Su(-2,2909; 1,3491; 0,3115; 0,3134)$
Коши	$\gamma(0,8839; 1,7507; 0,0019)$	$\gamma(1,4108; 1,0209; 0,0004)$	$\gamma(1,3546; 0,7565; 0,0005)$
Логистическое	$\gamma(0,8376; 2,1815; 0,0001)$	$Su(-2,9441; 1,7404; 0,3783; 0,3082)$	$\ln N(0,0831; 0,4473)$
Наибольшего значения	$\gamma(0,8856; 2,0700; 0,0002)$	$\ln N(0,2414; 0,7017)$	$\ln N(0,1501; 0,5108)$
Наименьшего значения	$\gamma(0,8856; 0,4831; 0,0002)$	$\ln N(0,2414; 0,7017)$	$\ln N(0,1501; 0,5108)$
Вейбулла	$\gamma(0,8856; 0,4831; 0,0002)^1)$	$\ln N(0,2414; 0,7017)^2)$	$\ln N(0,1501; 0,5108)$

1) Оценивали параметр формы распределения Вейбулла.
2) Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.

Т а б л и ц а А.12 — Процентные точки распределения статистики Смирнова при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	2,5765	3,0551	3,9327	4,8958	6,3157
Полунормальное	Масштабный	2,7317	3,3006	4,3688	5,5717	7,3926
Рэлея	Масштабный	2,6538	3,1698	4,1247	5,1830	6,7594
Максвелла	Масштабный	2,5826	3,0495	3,9011	4,8301	6,1918
Лапласа	Масштабный	3,3122	4,0778	5,3989	6,7310	8,5032
	Сдвиг	2,5343	2,9829	3,8007	4,6556	5,8229
	Два параметра	2,1134	2,4340	3,0160	3,6227	4,4495
Нормальное	Масштабный	3,5063	4,3091	5,6929	7,0868	8,9396
	Сдвиг	2,3656	2,6880	3,2205	3,7406	4,4163
	Два параметра	1,9860	2,2855	2,8102	3,3438	4,0581
Логнормальное	Масштабный	3,5354	4,3677	5,8074	7,2619	9,1998
	Сдвиг	2,3633	2,7212	3,3595	4,0397	5,0141
	Два параметра	2,1348	2,5025	3,1850	3,9446	5,0813
Коши	Масштабный	2,9947	3,6746	4,8455	6,0239	7,5894
	Сдвиг	2,5803	3,0471	3,8305	4,6011	5,6065
	Два параметра	1,8488	2,1898	2,7633	3,3284	4,0668
Логистическое	Масштабный	3,5929	4,4877	6,0215	7,2637	8,7397
	Сдвиг	2,1515	2,4357	2,9366	3,4632	4,2073
	Два параметра	1,7275	1,9277	2,2679	2,6112	3,0761
Наибольшего значения	Масштабный	3,5448	4,3493	5,7346	7,1286	8,9804
	Сдвиг	2,5565	3,0364	3,9180	4,8877	6,3205
	Два параметра	1,9729	2,2361	2,692	3,1621	3,8129

Окончание таблицы А.12

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Наименьшего значения	Масштабный	3,5448	4,3493	5,7346	7,1286	8,9804
	Сдвиг	2,5565	3,0364	3,9180	4,8877	6,3205
	Два параметра	1,9729	2,2361	2,692	3,1621	3,8129
Вейбулла	Формы	3,5448	4,3493	5,7346	7,1286	8,9804
	Масштаба	2,5565	3,0364	3,9180	4,8877	6,3205
	Два параметра	1,9729	2,2361	2,692	3,1621	3,8129

Т а б л и ц а А.13 — Аппроксимация предельных распределений статистики ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	Su(−1,8734; 1,2118; 0,0223; 0,0240)	—	—
Полунормальное	Sl(0,9735; 1,1966; 0,1531; 0,0116)	—	—
Рэлея	Su(−1,5302; 1,0371; 0,0202; 0,0299)	—	—
Максвелла	Su(−2,0089; 1,2557; 0,0213; 0,0213)	—	—
Лапласа	Sl(1,0274; 1,0675; 0,2305; 0,0120)	Su(−2,0821; 1,2979; 0,0196; 0,0200)	Su(−1,6085; 1,2139; 0,0171; 0,0247)
Нормальное	Sl(1,2532; 1,0088; 0,3066; 0,0130)	ln N(−2,7500; 0,5649)	ln N(−2,9794; 0,5330)
Логнормальное	Sl(1,0341; 1,1919; 0,2491; 0,0035)	ln N(−2,7271; 0,6092)	Su(−1,6292; 1,1541; 0,0144; 0,0234)
Коши	Sl(1,0341; 1,1137; 0,2313; 0,0041)	Sl(1,1230; 1,2964; 0,1383; 0,0105)	Sl(1,2420; 1,2833; 0,1135; 0,0064)
Логистическое	Sl(1,0289; 1,0666; 0,2385; 0,0110)	Sl(1,3982; 1,3804; 0,1205; 0,0102)	ln N(−3,1416; 0,4989)
Наибольшего значения	Sl(1,0294; 1,0781; 0,2381; 0,0120)	ln N(−2,5818; 0,6410)	ln N(−2,9541; 0,5379)
Наименьшего значения	Sl(1,0294; 1,0781; 0,2381; 0,0120)	ln N(−2,5818; 0,6410)	ln N(−2,9541; 0,5379)
Вейбулла	Sl(1,0294; 1,0781; 0,2381; 0,0120) ¹⁾	ln N(−2,5818; 0,6410) ²⁾	ln N(−2,9541; 0,5379)

¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла.
²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.

Т а б л и ц а А.14 — Процентные точки распределения статистики ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,1461	0,1738	0,2267	0,2872	0,3804
Полунормальное	Масштабный	0,1730	0,2097	0,2799	0,3607	0,4858
Рэля	Масштабный	0,1490	0,1812	0,2452	0,3219	0,4458
Максвелла	Масштабный	0,1408	0,1669	0,2162	0,2720	0,3573
Лапласа	Масштабный	0,2672	0,3447	0,4572	0,5570	0,6608
	Сдвиг	0,1276	0,1504	0,1932	0,2418	0,3173
	Два параметра	0,0998	0,1171	0,1504	0,1893	0,2529
Нормальное	Масштабный	0,2470	0,3035	0,4128	0,5397	0,7382
	Сдвиг	0,1148	0,1319	0,1619	0,1934	0,2379
	Два параметра	0,0883	0,1006	0,1221	0,1445	0,1756
Логнормальное	Масштабный	0,2531	0,3101	0,4193	0,5452	0,7401
	Сдвиг	0,1230	0,1428	0,1782	0,2159	0,2699
	Два параметра	0,0952	0,1125	0,1458	0,1845	0,2449
Коши	Масштабный	0,2359	0,2929	0,4044	0,5353	0,7422
	Сдвиг	0,1399	0,1668	0,2173	0,2743	0,3604
	Два параметра	0,1031	0,1235	0,1618	0,2050	0,2706
Логистическое	Масштабный	0,2612	0,3257	0,4368	0,5392	0,7617
	Сдвиг	0,1029	0,1209	0,1543	0,1912	0,2462
	Два параметра	0,0725	0,0819	0,0982	0,1149	0,1379
Наибольшего значения	Масштабный	0,2628	0,3226	0,4266	0,5461	0,7174
	Сдвиг	0,1470	0,1720	0,2171	0,2657	0,3360
	Два параметра	0,0910	0,1039	0,1263	0,1496	0,1822
Наименьшего значения	Масштабный	0,2628	0,3226	0,4266	0,5461	0,7174
	Сдвиг	0,1470	0,1720	0,2171	0,2657	0,3360
	Два параметра	0,0910	0,1039	0,1263	0,1496	0,1822
Вейбулла	Формы	0,2628	0,3226	0,4266	0,5461	0,7174
	Масштаба	0,1470	0,1720	0,2171	0,2657	0,3360
	Два параметра	0,0910	0,1039	0,1263	0,1496	0,1822

Т а б л и ц а А.15 — Аппроксимация предельных распределений минимума статистики ω^2 Мизеса (при использовании MD -оценок, минимизирующих статистику S_{ω})

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	Su(-1,9324; 1,1610; 0,0134; 0,0203)	—	—
Полунормальное	Su(-1,5024; 1,0991; 0,0173; 0,0256)	—	—
Рэля	Su(-1,4705; 1,1006; 0,0164; 0,0259)	—	—

Окончание таблицы А.15

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Максвелла	Su(-1,7706; 1,2978; 0,0188; 0,0220)	—	—
Лапласа	Sl(1,0117; 0,9485; 0,2162; 0,0137)	ln N(-2,8601; 0,5471)	ln N(-3,2853; 0,4666)
Нормальное	Sl(1,0477; 0,9883; 0,2356; 0,0112)	ln N(-2,8649; 0,5668)	ln N(-3,2715; 0,4645)
Логнормальное	Sl(1,0477; 0,9883; 0,2356; 0,0112)	ln N(-2,8649; 0,5668)	ln N(-3,2715; 0,4645)
Коши	Sl(1,2759; 1,0437; 0,2825; 0,0089)	ln N(-2,8577; 0,5739)	ln N(-3,2603; 0,4874)
Логистическое	Sl(1,0898; 1,0225; 0,2399; 0,0096)	ln N(-2,8831; 0,5367)	ln N(-3,2915; 0,4592)
Наибольшего значения	Sl(1,0771; 1,0388; 0,2065; 0,0109)	Su(-1,5348; 1,1226; 0,0166; 0,0252)	Su(-1,5326; 1,4446; 0,0147; 0,0188) ln N(-3,2627; 0,4680)
Наименьшего значения	Sl(1,0771; 1,0388; 0,2065; 0,0109)	Su(-1,5348; 1,1226; 0,0166; 0,0252)	Su(-1,5326; 1,4446; 0,0147; 0,0188) ln N(-3,2677; 0,4680)
Вейбулла	Sl(1,0771; 1,0388; 0,2065; 0,0109) ¹⁾	Su(-1,5348; 1,1226; 0,0166; 0,0252) ²⁾	Su(-1,5326; 1,4446; 0,0147; 0,0188) ln N(-3,2627; 0,4680)

¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла.
²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.

Т а б л и ц а А.16 — Процентные точки распределения минимума статистики ω^2 Мизеса (при использовании MD-оценок, минимизирующих статистику S_{ω})

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,1062	0,1266	0,1659	0,2115	0,2826
Полунормальное	Масштабный	0,1119	0,1338	0,1767	0,2271	0,3071
Рэлея	Масштабный	0,1051	0,1252	0,1645	0,2107	0,2839
Максвелла	Масштабный	0,1027	0,1198	0,1520	0,1880	0,2425
Лапласа	Масштабный	0,2471	0,2994	0,4079	0,5035	0,6253
	Сдвиг	0,1010	0,1154	0,1408	0,1673	0,2045
	Два параметра	0,0607	0,0681	0,0806	0,0934	0,1108
Нормальное	Масштабный	0,2558	0,3120	0,4253	0,5524	0,6935
	Сдвиг	0,1025	0,1178	0,1448	0,1731	0,2130
	Два параметра	0,0614	0,0688	0,0815	0,0943	0,1118
Логнормальное	Масштабный	0,2558	0,3120	0,4253	0,5524	0,6935
	Сдвиг	0,1025	0,1178	0,1448	0,1731	0,2130
	Два параметра	0,0614	0,0688	0,0815	0,0943	0,1118

Окончание таблицы А.16

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Коши	Масштабный	0,2376	0,2950	0,3924	0,5001	0,6886
	Сдвиг	0,1040	0,1198	0,1475	0,1768	0,2181
	Два параметра	0,0636	0,0717	0,0856	0,0998	0,1193
Логистическое	Масштабный	0,22605	0,3302	0,4450	0,57715	0,6941
	Сдвиг	0,0976	0,1113	0,1353	0,1602	0,1950
	Два параметра	0,0599	0,0670	0,0792	0,0915	0,1083
Наибольшего значения	Масштабный	0,2095	0,2623	0,3676	0,4940	0,6983
	Сдвиг	0,1064	0,1265	0,1657	0,2115	0,2836
	Два параметра	0,0611	0,0693	0,0843	0,1006	0,1246
Наименьшего значения	Масштабный	0,2095	0,2623	0,3676	0,4940	0,6983
	Сдвиг	0,1064	0,1265	0,1657	0,2115	0,2836
	Два параметра	0,0611	0,0693	0,0843	0,1006	0,1246
Вейбулла	Формы	0,2095	0,2623	0,3676	0,4940	0,6983
	Масштаба	0,1064	0,1265	0,1657	0,2115	0,2836
	Два параметра	0,0611	0,0693	0,0843	0,1006	0,1246

Т а б л и ц а А.17 — Аппроксимация предельных распределений статистики Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	Su(−2,8653; 1,4220; 0,1050; 0,1128)	—	—
Полунормальное	Su(−2,5603; 1,3116; 0,1147; 0,1330)	—	—
Рэлея	Su(−2,5610; 1,4003; 0,1174; 0,1337)	—	—
Максвелла	Su(−2,6064; 1,4426; 0,1190; 0,1285)	—	—
Лапласа	Sl(0,3224; 1,1638; 0,6852; 0,1040)	Su(−2,5528; 1,4006; 0,1216; 0,1358)	Su(−2,8942; 1,4897; 0,0846; 0,1131)
Нормальное	Su(−3,1163; 1,1787; 0,0742; 0,1200)	Su(−3,1202; 1,5233; 0,0874; 0,1087)	Su(−2,7057; 1,7154; 0,1043; 0,0925)
Логнормальное	Su(−2,4168; 1,1296; 0,1151; 0,1560)	ln N(−0,8052; 0,5123)	Su(−2,3966; 1,5967; 0,1012; 0,1179)
Коши	Su(−2,4935; 1,0789; 0,0923; 0,1458)	Su(−2,8420; 1,3528; 0,1010; 0,1221)	Su(−2,3195; 1,1812; 0,0769; 0,1217)
Логистическое	Sl(0,3065; 1,1628; 0,7002; 0,0930)	Su(−3,5408; 1,6041; 0,0773; 0,0829)	ln N(−1,1452; 0,4426)
Наибольшего значения	Su(−2,5427; 1,1057; 0,0960; 0,1569)	Su(−2,5550; 1,3714; 0,1152; 0,1289)	Su(−2,4622; 1,6473; 0,1075; 0,1149)

Окончание таблицы А.17

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Наименьшего значения	Su(−2,5427; 1,1057; 0,0960; 0,1569)	Su(−2,5550; 1,3714; 0,1152; 0,1289)	Su(−2,4622; 1,6473; 0,1075; 0,1149)
Вейбулла	Su(−2,5427; 1,1057; 0,0960; 0,1569) ¹⁾	Su(−2,5550; 1,3714; 0,1152; 0,1289) ²⁾	Su(−2,4622; 1,6473; 0,1075; 0,1149)
¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла. ²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла.			

Т а б л и ц а А.18 — Процентные точки распределения статистики Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,9256	1,0797	1,3626	1,6736	2,1333
Полунормальное	Масштабный	1,0195	1,2030	1,5463	1,9312	2,5117
Рэля	Масштабный	0,8954	1,0427	1,3140	1,6132	2,0569
Максвелла	Масштабный	0,8671	1,0055	1,2587	1,5360	1,9442
Лапласа	Масштабный	1,4627	1,7923	2,3158	2,8202	3,5035
	Сдвиг	0,9196	1,0712	1,3504	1,6586	2,1165
	Два параметра	0,7019	0,8082	1,0015	1,2116	1,5188
Нормальное	Масштабный	1,4126	1,7309	2,2533	2,8654	3,8453
	Сдвиг	0,7750	0,8923	1,1045	1,3341	1,6681
	Два параметра	0,5486	0,6204	0,7471	0,8806	1,0698
Логнормальное	Масштабный	1,4126	1,7309	2,2533	2,8654	3,8453
	Сдвиг	0,7602	0,8619	1,0382	1,2200	1,4719
	Два параметра	0,5464	0,6194	0,7498	0,8893	1,0897
Коши	Масштабный	1,3917	1,7432	2,2967	2,866	3,5085
	Сдвиг	1,0072	1,1841	1,5125	1,8781	2,4251
	Два параметра	0,7783	0,9307	1,2231	1,5606	2,0845
Логистическое	Масштабный	1,4097	1,7755	2,2268	2,8759	3,7694
	Сдвиг	0,7512	0,8622	1,0611	1,2741	1,5803
	Два параметра	0,5033	0,5610	0,6589	0,7575	0,8909
Наибольшего значения	Масштабный	1,4056	1,7163	2,2631	2,8443	3,6757
	Сдвиг	0,9149	1,0703	1,3577	1,6764	2,1514
	Два параметра	0,5580	0,6310	0,7608	0,8987	1,0956
Наименьшего значения	Масштабный	1,4056	1,7163	2,2631	2,8443	3,6757
	Сдвиг	0,9149	1,0703	1,3577	1,6764	2,1514
	Два параметра	0,5580	0,6310	0,7608	0,8987	1,0956
Вейбулла	Формы	1,4056	1,7163	2,2631	2,8443	3,6757
	Масштаба	0,9149	1,0703	1,3577	1,6764	2,1514
	Два параметра	0,5580	0,6310	0,7608	0,8987	1,0956

Т а б л и ц а А.19 — Аппроксимация предельных распределений статистики Ω^2 Мизеса (при использовании MD -оценок, минимизирующих статистику S_Ω)

Распределение случайной величины	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
Экспоненциальное	Su(−2,6741, 1,4068, 0,0958, 0,1230)	—	—
Полунормальное	Su(−2,6752, 1,3763, 0,0952, 0,1280)	—	—
Рэля	Su(−2,2734, 1,3473, 0,1101, 0,1496)	—	—
Максвелла	Su(−2,2759, 1,3988, 0,1171, 0,1514)	—	—
Лапласа	Su(−2,3884, 1,0811, 0,0948, 0,1548)	Su(−2,7267, 1,4972, 0,1044, 0,1239)	Su(−2,4334, 1,6104, 0,0902, 0,1123)
Нормальное	Su(−2,4180, 1,0702, 0,0957, 0,1464)	Su(−2,7639, 1,5393, 0,1102, 0,1115)	Su(−2,5746, 1,7505, 0,0979, 0,1043) ln N (−1,1651, 0,4271)
Логнормальное	Su(−2,4180, 1,0702, 0,0957, 0,1464)	Su(−2,7639, 1,5393, 0,1102, 0,1115)	Su(−2,5746, 1,7505, 0,0979, 0,1043) ln N (−1,1651, 0,4271)
Коши	Su(−2,5043, 1,1355, 0,1035, 0,1384)	Su(−2,7029, 1,5179, 0,1188, 0,1100)	Su(−2,1046, 1,4364, 0,0929, 0,1301) ln N (−1,1043, 0,4692)
Логистическое	Sl(0,3223, 1,1159, 0,6836, 0,0953) Su(−2,3007, 1,0135, 0,0906, 0,1593)	Su(−2,6212, 1,4318, 0,0932, 0,1370)	Su(−3,0152, 1,7751, 0,0800, 0,0898)
Наибольшего значения	Su(−2,4454, 1,1083, 0,0968, 0,1459)	Su(−2,6557, 1,4282, 0,1024, 0,1254)	Su(−2,1580, 1,5446, 0,0941, 0,1279)
Наименьшего значения	Su(−2,4454, 1,1083, 0,0968, 0,1459)	Su(−2,6557, 1,4282, 0,1024, 0,1254)	Su(−2,1580, 1,5446, 0,0941, 0,1279)
Вейбулла	Su(−2,4454, 1,1083, 0,0968, 0,1459) ¹⁾	Su(−2,6557, 1,4282, 0,1024, 0,1254) ²⁾	Su(−2,1580, 1,5446, 0,0941, 0,1279)
¹⁾ Оценивали параметр формы распределения Вейбулла ²⁾ Оценивали параметр масштаба распределения Вейбулла			

Т а б л и ц а А.20 — Процентные точки распределения минимума статистики Ω^2 Мизеса (при использовании MD -оценок, минимизирующих статистику S_Ω)

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Экспоненциальное	Масштабный	0,7892	0,9172	1,1527	1,4122	1,7967
Полунормальное	Масштабный	0,8308	0,9690	1,2245	1,5075	1,9292
Рэля	Масштабный	0,7871	0,9160	1,1553	1,4218	1,8206
Максвелла	Масштабный	0,7710	0,8916	1,1135	1,3582	1,7211
Лапласа	Масштабный	1,3751	1,6440	2,1787	2,6035	3,3197
	Сдвиг	0,7642	0,8795	1,0888	1,3160	1,6476
	Два параметра	0,4960	0,5607	0,6763	0,7996	0,9765

Окончание таблицы А 20

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Нормальное	Масштабный	1,3994	1,7302	2,2526	2,8345	3,5978
	Сдвиг	0,7575	0,8705	1,0745	1,2945	1,6137
	Два параметра	0,4832	0,5419	0,6451	0,7534	0,9061
Логнормальное	Масштабный	1,3994	1,7302	2,2526	2,8345	3,5978
	Сдвиг	0,7575	0,8705	1,0745	1,2945	1,6137
	Два параметра	0,4832	0,5419	0,6451	0,7534	0,9061
Коши	Масштабный	1,3487	1,6287	2,0930	2,7014	3,4728
	Сдвиг	0,8026	0,9257	1,1483	1,3893	1,7399
	Два параметра	0,5386	0,6164	0,7586	0,9142	1,1435
Логистическое	Масштабный	1,3917	1,7101	2,3316	3,0612	4,2139
	Сдвиг	0,7329	0,8454	1,0516	1,2778	1,6115
	Два параметра	0,4778	0,5363	0,6392	0,7470	0,8986
Наибольшего значения	Масштабный	1,2638	1,5415	2,0840	2,7220	3,7319
	Сдвиг	0,8007	0,9285	1,1628	1,4200	1,7997
	Два параметра	0,4941	0,5590	0,6757	0,8014	0,9832
Наименьшего значения	Масштабный	1,2638	1,5415	2,0840	2,7220	3,7319
	Сдвиг	0,8007	0,9285	1,1628	1,4200	1,7997
	Два параметра	0,4941	0,5590	0,6757	0,8014	0,9832
Вейбулла	Формы	1,2638	1,5415	2,0840	2,7220	3,7319
	Масштаба	0,8007	0,9285	1,1628	1,4200	1,7997
	Два параметра	0,4941	0,5590	0,6757	0,8014	0,9832

Т а б л и ц а А 21 — Аппроксимация предельных распределений статистики Колмогорова при использовании метода максимального правдоподобия и проверке согласия с гамма-распределением

Значение параметра формы	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра формы	двух параметров
0,3	Su(−3,1261, 2,4210, 0,2564, 0,3176)	Su(−2,5800, 2,3573, 0,2522, 0,3652)	Su(−2,4004, 2,2110, 0,2222, 0,3679)
0,5	$\gamma(3,8019, 0,1122, 0,3426)$	Su(−2,5116, 2,4317, 0,2624, 0,3737)	Su(−2,8715, 2,5280, 0,2325, 0,3296)
1,0	$\gamma(4,4861, 0,0961, 0,3093)$	$\gamma(4,4582, 0,0888, 0,3178)$	Su(−2,4192, 2,2314, 0,2037, 0,3707)
2,0	Su(−2,2691, 2,2383, 0,2323, 0,3958)	Su(−3,0644, 2,6833, 0,2531, 0,3159)	Su(−2,2110, 2,1457, 0,1988, 0,3872)
3,0	Su(−2,4869, 2,4779, 0,2655, 0,3742)	Su(−2,5510, 2,4430, 0,2430, 0,3640)	Su(−2,1298, 2,1802, 0,2103, 0,3897)
4,0	Su(−2,4229, 2,4457, 0,2627, 0,3696)	Su(−2,0448, 2,2821, 0,2494, 0,4140)	Su(−2,4946, 2,2762, 0,2023, 0,3589)
5,0	Su(−2,4152, 2,3901, 0,2475, 0,3818)	Su(−2,2143, 2,2844, 0,2367, 0,3932)	Su(−2,0501, 2,1119, 0,2016, 0,3985)

Т а б л и ц а А.22 — Процентные точки распределения статистики Колмогорова при использовании метода максимального правдоподобия и проверке гипотезы о согласии с гамма-распределением

Значение параметра формы	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
0,3	Масштабный	1,0101	1,0885	1,2196	1,3497	1,5231
	Формы	0,9228	0,9895	1,1012	1,2120	1,3602
	Два параметра	0,8702	0,9343	1,0424	1,1508	1,2970
0,5	Масштабный	0,9890	1,0625	1,1808	1,2927	1,4341
	Формы	0,9076	0,9704	1,0748	1,1780	1,3151
	Два параметра	0,8503	0,9081	1,0040	1,0984	1,2233
1,0	Масштабный	0,9461	1,0131	1,1204	1,2214	1,3483
	Формы	0,9031	0,9649	1,0638	1,1569	1,2740
	Два параметра	0,8283	0,8862	0,9836	1,0813	1,2128
2,0	Масштабный	0,9115	0,9694	1,0620	1,1466	1,2859
	Формы	0,8719	0,9301	1,0260	1,1196	1,2425
	Два параметра	0,8168	0,8738	0,9703	1,0674	1,1989
3,0	Масштабный	0,8924	0,9527	1,0525	1,1509	1,2812
	Формы	0,8636	0,9220	1,0190	1,1148	1,2421
	Два параметра	0,8144	0,8704	0,9650	1,0598	1,1879
4,0	Масштабный	0,8781	0,9381	1,0377	1,1361	1,2665
	Формы	0,8628	0,9207	1,0174	1,1136	1,2423
	Два параметра	0,8146	0,8711	0,9659	1,0606	1,1877
5,0	Масштабный	0,8771	0,9366	1,0357	1,1338	1,2645
	Формы	0,8558	0,9143	1,0123	1,1099	1,2408
	Два параметра	0,8098	0,8659	0,9608	1,0565	1,1865

Т а б л и ц а А.23 — Аппроксимация предельных распределений статистики Смирнова при использовании метода максимального правдоподобия и проверке согласия с гамма-распределением

Значение параметра формы	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра формы	двух параметров
0,3	Su(−3,1901; 1,1381; 0,1399; 0,0081)	Su(−2,8117; 1,3517; 0,2973; 0,1474)	Su(−2,4288; 1,2878; 0,2749; 0,2074)
0,5	Su(−2,8625; 1,1796; 0,2003; 0,079)	Su(−2,8816; 1,4625; 0,3377; 0,1280)	Su(−2,4027; 1,3861; 0,3389; 0,2290) ln N(−0,1506; 0,6511)
1,0	ln N(0,2062; 0,7337) Su(−2,5635; 1,2797; 0,2922; 0,1584)	Su(−2,5861; 1,4818; 0,4130; 0,174)	Su(−2,2666; 1,3824; 0,3515; 0,2731)
2,0	Su(−2,5372; 1,3749; 0,3464; 0,2162)	Su(−2,3222; 1,4442; 0,4335; 0,2845)	Su(−2,2109; 1,3527; 0,3317; 0,3149)
3,0	Su(−2,3014; 1,3875; 0,3991; 0,2750)	Su(−2,3895; 1,4817; 0,4344; 0,2824)	Su(−2,4295; 1,4110; 0,3163; 0,2784)
4,0	Su(−2,3759; 1,4418; 0,4149; 0,2480)	Su(−2,2574; 1,4921; 0,4694; 0,3216)	Su(−2,4153; 1,4306; 0,3318; 0,2604)
5,0	Su(−2,4574; 1,4599; 0,3976; 0,2712)	Su(−2,2611; 1,4644; 0,4393; 0,3231)	Su(−2,1345; 1,3945; 0,3655; 0,3263)

Т а б л и ц а А.24 — Процентные точки распределения статистики Смирнова при использовании метода максимального правдоподобия и проверке гипотезы о согласии с гамма-распределением

Значение параметра формы	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
0,3	Масштабный	2,8746	3,5643	4,9025	6,4644	8,9168
	Формы	2,7006	3,2114	4,1601	5,2162	6,7967
	Два параметра	2,2246	2,6511	3,4520	4,3543	5,7217
0,5	Масштабный	2,8051	3,4363	4,6490	6,0496	8,2255
	Формы	2,5766	3,0273	3,8498	4,7480	6,0664
	Два параметра	2,2406	2,6348	3,3620	4,1659	5,3609
1,0	Масштабный	2,6291	3,1471	4,1084	5,1770	6,7737
	Формы	2,5364	2,9673	3,7509	4,6036	5,8510
	Два параметра	2,1738	2,5483	3,2393	4,0035	5,1400
2,0	Масштабный	2,5334	2,9902	3,8349	4,7709	6,1652
	Формы	2,4813	2,8949	3,6506	4,4775	5,6940
	Два параметра	2,1292	2,4951	3,1737	3,9281	5,0563
3,0	Масштабный	2,4691	2,8995	3,6930	4,5698	5,8727
	Формы	2,4538	2,8516	3,5745	4,3608	5,5106
	Два параметра	2,1092	2,4613	3,1083	3,8204	4,8743
4,0	Масштабный	2,4404	2,8534	3,6084	4,4348	5,6514
	Формы	2,4299	2,8149	3,5130	4,2708	5,3768
	Два параметра	2,0978	2,4463	3,0847	3,7850	4,8178
5,0	Масштабный	2,4296	2,8303	3,5611	4,3589	5,5299
	Формы	2,3877	2,7717	3,4709	4,2333	5,3511
	Два параметра	2,0833	2,4276	3,0613	3,7602	4,7972

Т а б л и ц а А.25 — Аппроксимация предельных распределений статистики ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия и проверке согласия с гамма-распределением

Значение параметра формы	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра формы	двух параметров
0,3	Su(−1,6653; 0,9957; 0,0213; 0,0286)	Su(−1,4885; 1,0365; 0,0196; 0,0305)	Su(−1,4703; 1,0481; 0,0167; 0,0258)
0,5	Su(−2,1013; 1,0964; 0,0172; 0,0233)	Su(−1,7133; 1,1339; 0,0203; 0,0267) ln N(−2,6112; 0,6152)	Su(−1,5811; 1,1193; 0,0164; 0,0243) ln N(−2,8269; 0,5922)
1,0	Su(−1,8467; 1,0824; 0,0179; 0,0250)	Su(−1,5966; 1,0899; 0,0191; 0,0281)	Su(−1,5388; 1,0487; 0,0131; 0,0249) ln N(−2,8658; 0,5850)
2,0	Su(−1,6042; 1,1125; 0,0207; 0,0281) ln N(−2,6123; 0,6231)	Su(−1,6693; 1,1076; 0,0181; 0,0264) ln N(−2,6844; 0,6119)	Su(−1,3082; 1,0059; 0,0146; 0,0269)
3,0	Su(−2,1337; 1,1654; 0,015; 0,0217)	Su(−1,5872; 1,0916; 0,0181; 0,0272)	Su(−1,4044; 1,0562; 0,0148; 0,0261)

Окончание таблицы А.25

Значение параметра формы	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра формы	двух параметров
4,0	Su(−1,5813; 1,1339; 0,0206; 0,0273) ln N(−2,6668; 0,6097)	Su(−1,5748; 1,1003; 0,0183; 0,0275) ln N(−2,6947; 0,6012)	Su(−1,4222; 1,0519; 0,0143; 0,0260)
5,0	Su(−1,6144; 1,1468; 0,0202; 0,0265) ln N(−2,6732; 0,6052)	Su(−1,7641; 1,1417; 0,0172; 0,0238) ln N(−2,7198; 0,6001)	Su(−1,2912; 1,0213; 0,0144; 0,0274)

Т а б л и ц а А.26 — Процентные точки распределения статистики ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия и проверке гипотезы о согласии с гамма-распределением

Значение параметра формы	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
0,3	Масштабный	0,1885	0,2335	0,3241	0,4344	0,6151
	Формы	0,1416	0,1717	0,2314	0,3031	0,4190
	Два параметра	0,1163	0,1405	0,1885	0,2458	0,3381
0,5	Масштабный	0,1733	0,2110	0,2851	0,3724	0,5110
	Формы	0,1405	0,1684	0,2224	0,2853	0,3843
	Два параметра	0,1085	0,1295	0,1702	0,2179	0,2932
1,0	Масштабный	0,1528	0,1856	0,2499	0,3262	0,4477
	Формы	0,1342	0,1613	0,2145	0,2773	0,3771
	Два параметра	0,1017	0,1220	0,1623	0,2107	0,2888
2,0	Масштабный	0,1383	0,1658	0,2195	0,2825	0,3821
	Формы	0,1297	0,1557	0,2063	0,2658	0,3599
	Два параметра	0,1007	0,1209	0,1609	0,2088	0,2859
3,0	Масштабный	0,1351	0,1618	0,2133	0,2730	0,3660
	Формы	0,1265	0,1519	0,2015	0,2601	0,3533
	Два параметра	0,1000	0,1196	0,1584	0,2047	0,2790
4,0	Масштабный	0,1299	0,1551	0,2039	0,2608	0,3502
	Формы	0,1248	0,1495	0,1977	0,2544	0,3444
	Два параметра	0,0993	0,1189	0,1576	0,2038	0,2781
5,0	Масштабный	0,1274	0,1519	0,1991	0,2541	0,3400
	Формы	0,1230	0,1471	0,1937	0,2479	0,3329
	Два параметра	0,0970	0,1162	0,1546	0,2008	0,2759

Т а б л и ц а А.27 — Аппроксимация предельных распределений статистики Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия и проверке согласия с гамма-распределением

Значение параметра формы	При оценивании		
	только масштабного параметра	только параметра сдвига	двух параметров
0,3	Su(−2,4570; 1,2601; 0,1187; 0,1380)	Su(−2,8799; 1,4942; 0,1088; 0,1149)	Su(−2,4649; 1,5188; 0,1035; 0,1141)
0,5	Su(−2,5752; 1,3505; 0,1078; 0,1355)	Su(−2,6867; 1,4854; 0,1155; 0,1193)	Su(−2,6917; 1,6334; 0,0970; 0,1067)
1,0	Su(−2,5752; 1,3505; 0,1078; 0,1355)	Su(−2,6867; 1,4854; 0,1155; 0,1193)	Su(−2,6917; 1,6334; 0,0970; 0,1067)
2,0	Su(−2,4667; 1,4180; 0,1207; 0,1416)	Su(−2,7782; 1,4780; 0,1041; 0,1181)	Su(−2,5083; 1,6002; 0,0992; 0,1150)
3,0	Su(−2,7121; 1,4220; 0,1007; 0,1321)	Su(−2,6425; 1,4834; 0,1132; 0,1224)	Su(−2,4614; 1,6592; 0,1106; 0,1125)
4,0	Su(−2,6722; 1,4316; 0,1036; 0,1315)	Su(−3,1020; 1,5114; 0,0884; 0,1041)	Su(−2,9531; 1,7024; 0,0902; 0,0935)
5,0	Su(−2,7351; 1,4967; 0,1109; 0,1187)	Su(−2,6935; 1,5149; 0,1123; 0,1184)	Su(−3,0056; 1,7207; 0,0895; 0,0912)

Т а б л и ц а А.28 — Процентные точки распределения статистики Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия и проверке гипотезы о согласии с гамма-распределением

Значение параметра формы	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
0,3	Масштабный	1,0837	1,2882	1,6743	2,1120	2,7791
	Формы	0,8589	0,9929	1,2362	1,5006	1,8867
	Два параметра	0,6279	0,7195	0,8852	1,0645	1,3251
0,5	Масштабный	1,0067	1,1869	1,5242	1,9028	2,4744
	Формы	0,8501	0,9811	1,2190	1,4777	1,8556
	Два параметра	0,5987	0,6822	0,8322	0,9932	1,2257
1,0	Масштабный	0,9134	1,0696	1,3597	1,6825	2,1656
	Формы	0,8230	0,9508	1,1832	1,4359	1,8055
	Два параметра	0,5771	0,6547	0,7931	0,9405	1,1515
2,0	Масштабный	0,8507	0,9863	1,2352	1,5088	1,9133
	Формы	0,8014	0,9259	1,1527	1,3997	1,7613
	Два параметра	0,5641	0,6401	0,7760	0,9214	1,1302
3,0	Масштабный	0,8313	0,9641	1,2079	1,4758	1,8716
	Формы	0,7935	0,9157	1,1378	1,3795	1,7330
	Два параметра	0,5611	0,6345	0,7648	0,9030	1,1001
4,0	Масштабный	0,8185	0,9481	1,1857	1,4464	1,8309
	Формы	0,7846	0,9054	1,1243	1,3616	1,7074
	Два параметра	0,5590	0,6324	0,7622	0,8993	1,0938
5,0	Масштабный	0,8036	0,9269	1,1508	1,3940	1,7489
	Формы	0,7723	0,8887	1,0995	1,3277	1,6598
	Два параметра	0,5557	0,6281	0,7558	0,8905	1,0813

Т а б л и ц а А 29 — Модели предельных распределений статистик непараметрических критериев при проверке гипотез о согласии с распределением *Sb*-Джонсона

Оцениваемый параметр	Распределение статистики		
	Колмогорова	ω^2 Мизеса	Ω^2 Мизеса
θ_0	$\ln N(-0,4138, 0,2289)$	$\ln N(-2,7500, 0,5649)$	$Su(-2,7925, 1,5513, 0,1138, 0,1165)$
θ_1	$\ln N(-0,2220, 0,3031)$	$S1(0,9845, 1,1812, 0,2354, 0,0053)$	$Su(-3,2608, 1,2469, 0,0836, 0,0883)$
θ_0, θ_1	$\gamma(5,2261, 0,0663, 0,2886)$	$Su(-2,5137, 1,5524, 0,0159, 0,0118)$	$Su(-2,1210, 1,5490, 0,1113, 0,1325)$

Т а б л и ц а А 30 — Модели предельных распределений статистик непараметрических критериев при проверке гипотез о согласии с распределением *SI*-Джонсона

Оцениваемый параметр	Распределение статистики		
	Колмогорова	ω^2 Мизеса	Ω^2 Мизеса
θ_0	$\ln N(-0,4138, 0,2289)$	$\ln N(-2,7500, 0,5649)$	$Su(-2,7925, 1,5513, 0,1138, 0,1165)$
θ_1	$\ln N(-0,2220, 0,3031)$	$S1(0,9845, 1,1812, 0,2354, 0,0053)$	$Su(-3,2608, 1,2469, 0,0836, 0,0883)$
θ_2	$\ln N(-0,4138, 0,2289)$	$\ln N(-2,7500, 0,5649)$	$Su(-2,7925, 1,5513, 0,1138, 0,1165)$
θ_0, θ_1	$\gamma(5,1416, 0,0672, 0,2886)$	$Su(-1,8744, 1,2526, 0,0142, 0,0198)$	$Su(-2,3550, 1,5797, 0,1050, 0,1179)$
θ_0, θ_2	$\ln N(-0,4226, 0,2266)$	$\ln N(-2,7644, 0,5569)$	$Su(-3,0997, 1,5568, 0,0937, 0,1023)$
θ_1, θ_2	$\gamma(5,1416, 0,0672, 0,2886)$	$Su(-1,8744, 1,2526, 0,0142, 0,0198)$	$Su(-2,3550, 1,5797, 0,1050, 0,1179)$
$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	$\ln N(-0,4733, 0,2271)$	$\ln N(-2,9537, 0,5251)$	$Su(-1,9900, 1,5211, 0,1145, 0,1445)$

Т а б л и ц а А 31 — Модели предельных распределений статистик непараметрических критериев при проверке гипотез о согласии с распределением *Su*-Джонсона

Оцениваемый параметр	Распределение статистики		
	Колмогорова	ω^2 Мизеса	Ω^2 Мизеса
θ_0	$\ln N(-0,4138, 0,2289)$	$\ln N(-2,7500, 0,5649)$	$Su(-2,7925, 1,5513, 0,1138, 0,1165)$
θ_1	$\ln N(-0,2220, 0,3031)$	$S1(0,9845, 1,1812, 0,2354, 0,0053)$	$Su(-3,2608, 1,2469, 0,0836, 0,0883)$
θ_2	$\ln N(-0,2594, 0,2990)$	$S1(1,0352, 1,1218, 0,2284, 0,0070)$	$Su(-3,0091, 1,1753, 0,0787, 0,1050)$
θ_3	$\ln N(-0,4316, 0,2341)$	$Su(-1,7738, 1,2418, 0,0173, 0,0232)$	$Su(-2,7823, 1,5327, 0,1140, 0,1125)$
θ_0, θ_1	$\gamma(5,2263, 0,0658, 0,2886)$	$Su(-1,7649, 1,2854, 0,0151, 0,0208)$	$Su(-2,3262, 1,5422, 0,0964, 0,1235)$
θ_0, θ_2	$Su(-2,5586, 2,4112, 0,1908, 0,3411)$	$\ln N(-3,1024, 0,5069)$	$Su(-2,1247, 1,4688, 0,0863, 0,1339)$

Окончание таблицы А.31

Оцениваемый параметр	Распределение статистики		
	Колмогорова	ω^2 Мизеса	Ω^2 Мизеса
θ_0, θ_3	Su(-2,3187; 2,2729; 0,1888; 0,3607)	Su(-1,4187; 1,0120; 0,0117; 0,0232)	Su(-2,2356; 1,2901; 0,0799; 0,1327)
θ_1, θ_2	In N(-0,2836; 0,3039)	SI(1,0334; 1,1037; 0,2220; 0,0060)	Su(-3,1039; 1,1372; 0,062; 0,0950)
θ_1, θ_3	In N(-0,5199; 0,2184)	In N(-3,0545; 0,5152)	SI(0,6951; 1,4454; 0,4295; 0,0818)
θ_2, θ_3	Su(-2,5904; 2,5548; 0,1859; 0,3300)	Su(-1,6883; 1,2861; 0,0121; 0,0187)	Su(-2,1944; 1,3600; 0,0804; 0,1262)
$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	Su(-2,1848; 2,1100; 0,1651; 0,3611)	Su(-1,2247; 1,0971; 0,0120; 0,0228)	Su(-2,2549; 1,4569; 0,0715; 0,1163)
$\theta_0, \theta_1, \theta_3$	$\gamma(4,8573; 0,0568; 0,2890)$	In N(-3,2677; 0,4767)	In N(-1,3166; 0,4065)
$\theta_0, \theta_2, \theta_3$	In N(-0,6615; 0,1929)	$\gamma(2,6159; 0,0097; 0,0098)$	In N(-1,4121; 0,3753)
$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	In N(-0,6101; 0,2020)	Su(-1,5455; 1,2383; 0,0108; 0,0186)	Su(-2,2203; 1,3198; 0,0646; 0,1203)
$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$	In N(-0,7128; 0,1923)	In N(-3,5836; 0,4154)	$\gamma(3,6074; 0,0429; 0,0629)$

Т а б л и ц а А.32 — Процентные точки распределения статистики Колмогорова при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
Sb-Джонсона	θ_0	0,8381	0,8865	0,9634	1,0354	1,1260
	θ_1	1,0965	1,1811	1,3186	1,4507	1,6211
	θ_0, θ_1	0,7889	0,8379	0,9161	0,9892	1,0808
SI-Джонсона	θ_0	0,8381	0,8865	0,9634	1,0354	1,1260
	θ_1	1,0965	1,1811	1,3186	1,4507	1,6211
	θ_2	0,8381	0,8865	0,9634	1,0354	1,1260
	θ_0, θ_1	0,7887	0,8381	0,9168	0,9906	1,0829
	θ_0, θ_2	0,8288	0,8762	0,9513	1,0218	1,1102
	θ_1, θ_2	0,7887	0,8381	0,9168	0,9906	1,0829
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,7883	0,8334	0,9051	0,9722	1,0566
Su-Джонсона	θ_0	0,8381	0,8865	0,9634	1,0354	1,1260
	θ_1	1,0965	1,1811	1,3186	1,4507	1,6211
	θ_2	1,0518	1,1318	1,2616	1,3863	1,5468
	θ_3	0,8278	0,8767	0,9545	1,0276	1,1196
	θ_0, θ_1	0,7852	0,8338	0,9113	0,9840	1,0749
	θ_0, θ_2	0,7433	0,7907	0,8697	0,9479	1,0520
	θ_0, θ_3	0,7522	0,8015	0,8841	0,9665	1,0771
	θ_1, θ_2	1,0319	1,1117	1,2414	1,3662	1,5271
	θ_1, θ_3	0,7456	0,7866	0,8516	0,9122	0,9882

Окончание таблицы А.32

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
<i>Si</i> -Джонсона	θ_2, θ_3	0,6919	0,7327	0,8000	0,8661	0,9533
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,7231	0,7719	0,8546	0,9381	1,0516
	$\theta_0, \theta_1, \theta_3$	0,6917	0,7325	0,7977	0,8590	0,9357
	$\theta_0, \theta_2, \theta_3$	0,6303	0,6608	0,7088	0,7532	0,8084
	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,6698	0,7038	0,7574	0,8072	0,8692
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,5984	0,6273	0,6727	0,7147	0,7669

Т а б л и ц а А.33 — Процентные точки распределения статистики ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
<i>Sb</i> -Джонсона	θ_0	0,1148	0,1319	0,1619	0,1934	0,2379
	θ_1	0,2513	0,3080	0,4170	0,5429	0,7384
	θ_0, θ_1	0,0893	0,1028	0,1271	0,1532	0,1911
<i>SI</i> -Джонсона	θ_0	0,1148	0,1319	0,1619	0,1934	0,2379
	θ_1	0,2513	0,3080	0,4170	0,5429	0,7384
	θ_2	0,1148	0,1319	0,1619	0,1934	0,2379
	θ_0, θ_1	0,0916	0,1074	0,1373	0,1711	0,2227
	θ_0, θ_2	0,1122	0,1286	0,1575	0,1877	0,2302
	θ_1, θ_2	0,0916	0,1074	0,1373	0,1711	0,2227
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,0899	0,1022	0,1237	0,1459	0,1769
<i>Si</i> -Джонсона	θ_0	0,1148	0,1319	0,1619	0,1934	0,2379
	θ_1	0,2513	0,3080	0,4170	0,5429	0,7384
	θ_2	0,2357	0,2915	0,4003	0,5278	0,7290
	θ_3	0,1054	0,1238	0,1584	0,1977	0,2578
	θ_0, θ_1	0,0867	0,1009	0,1274	0,1573	0,2026
	θ_0, θ_2	0,0760	0,0861	0,1035	0,1214	0,1461
	θ_0, θ_3	0,0889	0,1071	0,1437	0,1878	0,2598
	θ_1, θ_2	0,2286	0,2840	0,3923	0,5200	0,7223
	θ_1, θ_3	0,0804	0,0912	0,1100	0,1294	0,1563
	θ_2, θ_3	0,0683	0,0790	0,0990	0,1216	0,1557
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,0692	0,0811	0,1044	0,1318	0,1753
	$\theta_0, \theta_1, \theta_3$	0,0624	0,0702	0,0834	0,0970	0,1155
	$\theta_0, \theta_2, \theta_3$	0,0507	0,0562	0,0652	0,0739	0,0849
	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,0614	0,0710	0,0892	0,1099	0,1415
$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,0427	0,0473	0,0550	0,0627	0,0730	

Т а б л и ц а А.34 — Процентные точки распределения статистики Ω^2 Мизеса при использовании метода максимального правдоподобия

Распределение случайной величины	Оцениваемый параметр	Верхние процентные точки				
		0,15	0,1	0,05	0,025	0,01
<i>Sb</i> -Джонсона	θ_0	0,7832	0,8988	1,1072	1,3317	1,6567
	θ_1	1,3989	1,6841	2,2245	2,8391	3,7791
	θ_0, θ_1	0,5525	0,6269	0,7605	0,9041	1,1119
<i>Sl</i> -Джонсона	θ_0	0,7832	0,8988	1,1072	1,3317	1,6567
	θ_1	1,3989	1,6841	2,2245	2,8391	3,7791
	θ_2	0,7832	0,8988	1,1072	1,3317	1,6567
	θ_0, θ_1	0,5611	0,6374	0,7741	0,9207	1,1318
	θ_0, θ_2	0,7667	0,8810	1,0870	1,3088	1,6298
	θ_1, θ_2	0,5611	0,6374	0,7741	0,9207	1,1318
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,5553	0,6297	0,7638	0,9086	1,1187
<i>Su</i> -Джонсона	θ_0	0,7832	0,8988	1,1072	1,3317	1,6567
	θ_1	1,3989	1,6841	2,2245	2,8391	3,7791
	θ_2	1,3336	1,6190	2,1680	2,8028	3,7900
	θ_3	0,7963	0,9164	1,1334	1,3677	1,7079
	θ_0, θ_1	0,5446	0,6189	0,7527	0,8969	1,1057
	θ_0, θ_2	0,5001	0,5683	0,6924	0,8274	1,0253
	θ_0, θ_3	0,6342	0,7403	0,9395	1,1637	1,5032
	θ_1, θ_2	1,2760	1,5604	2,1124	2,7568	3,7689
	θ_1, θ_3	0,6257	0,7262	0,9104	1,1122	1,4095
	θ_2, θ_3	0,5549	0,6409	0,8003	0,9771	1,2412
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$	0,4549	0,5182	0,6336	0,7595	0,9445
	$\theta_0, \theta_1, \theta_3$	0,4085	0,4513	0,5231	0,5946	0,6901
	$\theta_0, \theta_2, \theta_3$	0,3595	0,3941	0,4517	0,5084	0,5833
	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,4985	0,5767	0,7226	0,8859	1,1316
	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$	0,2994	0,3269	0,3713	0,4135	0,4667

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Библиография

- [1] Денисов В. И., Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим: Методические рекомендации. Часть I. Критерии типа χ^2 . — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. — С. 126
- [2] Kolmogoroff A. N. Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. // G. Ist. Ital. attuar. — 1933. — Vol. 4. — № 1. — P. 83—91
- [3] Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. — М.: Наука, 1983. — 416 с.
- [4] Anderson T. W., Darling D. A. Asymptotic theory of certain «Goodness of fit» criteria based on stochastic processes. — AMS, 1952, 23. — P. 193—212
- [5] Орлов А. И. Распространенная ошибка при использовании критериев Колмогорова и омега-квадрат // Заводская лаборатория. — 1985. — Т. 51. — № 1. — С. 60—62
- [6] Бондарев Б. В. О проверке сложных статистических гипотез // Заводская лаборатория. — 1986. — Т. 52. — № 10. — С. 62—63
- [7] Кулинская Е. В., Саввушкина Н. Е. О некоторых ошибках в реализации и применении непараметрических методов в пакете для IBM PC // Заводская лаборатория. — 1990. — Т. 56. — № 5. — С. 96—99
- [8] Кас М., Kiefer J., Wolfowitz J. On tests of normality and other tests of goodness of fit based on distance methods // Ann. Math. Stat. — 1955. — V. 26. — P. 189—211
- [9] Durbin J. Kolmogoriv — Smirnov test when parameters are estimated // Lect. Notes Math. — 1976. — V. 566. — P. 33—44
- [10] Мартынов Г. В. Критерии омега-квадрат. — М.: Наука, 1978. — 80 с.
- [11] Pearson E. S., Hartley H. O. Biometrika tables for Statistics. V. 2. — Cambridge: University Press, 1972. — 634 p.
- [12] Stephens M. A. Use of Kolmogorov — Smirnov, Cramer — von Mises and related statistics — without extensive table // J. R. Stat. Soc. — 1970. — B. 32. — P. 115—122
- [13] Stephens M. A. EDF statistics for goodness of fit and some comparisons // J. Am. Statist. Assoc. — 1974 — V. 69. — P. 730—737
- [14] Chandra M., Singpurwalla N. D., Stephens M. A. Statistics for Test of Fit for the Extrem-Value and Weibull Distribution // J. Am. Statist. Assoc. — 1981. — V. 76. — P. 375
- [15] Тюрин Ю. Н. О предельном распределении статистик Колмогорова — Смирнова для сложной гипотезы // Изв. АН СССР. Сер. Матем. — 1984. — Т. 48. — № 6. — С. 1314—1343
- [16] Тюрин Ю. Н., Саввушкина Н. Е. Критерии согласия для распределения Вейбулла — Гнеденко // Изв. АН СССР. Сер. Техн. Кибернетика. — 1984. — № 3. — С. 109—112
- [17] Тюрин Ю. Н. Исследования по непараметрической статистике (непараметрические методы и линейная модель): Автореф. дисс. д-ра физ.-мат. наук. — М., 1985. — 33 с. — (МГУ)
- [18] Саввушкина Н. Е. Критерий Колмогорова — Смирнова для логистического и гамма-распределения // Сб. тр. ВНИИ систем. исслед. — 1990, № 8
- [19] Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. — М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. — 384 с.
- [20] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Прикладные аспекты использования критериев согласия в случае проверки сложных гипотез // Надежность и контроль качества. — 1997. — № 11. — С. 3—17
- [21] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. О распределениях статистик непараметрических критериев согласия при оценивании по выборкам параметров наблюдаемых законов // Заводская лаборатория. — 1998. — Т. 64. — № 3. — С. 61—72
- [22] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Исследование допредельных распределений статистик критериев согласия при проверке сложных гипотез // Тр. IV международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения». — Новосибирск. — 1998. — Т. 3. — С. 12—16
- [23] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. О зависимости распределений статистик непараметрических критериев и их мощности от метода оценивания параметров // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. — 2001. — Т. 67. — № 7
- [24] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Применение непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез // Автотметрия. — 2001. — № 2. — С. 88—102
- [25] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. О зависимости предельных распределений статистик χ^2 Пирсона и отношения правдоподобия от способа группирования данных // Заводская лаборатория. — 1998. — Т. 64. — № 5. — С. 56—63
- [26] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Статистический анализ одномерных наблюдений по частично группированным данным // Изв. вузов. Физика. — Томск, 1995. — № 9. — С. 39—45

- [27] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Статистический анализ смесей распределений по частично группированным данным // Сб. научных трудов НГТУ. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1995. — № 1. — С. 25—31
- [28] Орлов А. И. Методы оценки близости допредельных и предельных распределений статистик // Заводская лаборатория. — 1998. — Т. 64. — № 5. — С. 64—67
- [29] Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. — М.: Наука, 1982. — 296 с.
- [30] Орлов А. И. Неустойчивость параметрических методов отбраковки резко выделяющихся наблюдений // Заводская лаборатория. — 1992. — Т. 58. — № 7. — С. 40—42
- [31] Денисов В. И., Лемешко Б. Ю., Цой Е. Б. Оптимальное группирование, оценка параметров и планирование регрессионных экспериментов: В 2 ч. / Новосиб. гос. техн. ун-т. — Новосибирск, 1993. — 346 с.
- [32] Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Вопросы обработки выборок одномерных случайных величин // Научный вестник НГТУ. — Новосибирск, 1996. — № 2. — С. 3—24
- [33] Лемешко Б. Ю. Асимптотически оптимальное группирование наблюдений — это обеспечение максимальной мощности критериев // Надежность и контроль качества. — 1997. — № 8. — С. 3—14
- [34] Лемешко Б. Ю. Асимптотически оптимальное группирование наблюдений в критериях согласия // Заводская лаборатория. — 1998. — Т. 64. — № 1. — С. 56—64
- [35] Rao C. R. Criteria of estimation in large samples // Sankhya, 1962. — V. 25. — P. 189—206
- [36] Рао С. Р. Линейные статистические методы и их применения. — М.: Наука, 1968. — 548 с.
- [37] Губарев В. В. Вероятностные модели: Справочник. В 2 ч. / Новосиб. электротехн. ин-т. — Новосибирск, 1992. — 422 с.

УДК 311.218:311(084):006.354

ОКС 03.120.30

ОКСТУ 0011

Ключевые слова: проверка гипотез, критерии согласия, простые и сложные гипотезы, статистика критерия, распределение статистики, уровень значимости, конкурирующая гипотеза, мощность критерия, статистическое моделирование

Прикладная статистика
ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ СОГЛАСИЯ ОПЫТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ

Часть II

Непараметрические критерии

Р 50.1.037—2002

БЗ 2—2001/5

Редактор Л. В. Афанасенко
Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор Е. Ю. Митрофанова
Компьютерная верстка З. И. Мартыновой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 26.02.2002. Подписано в печать 20.06.2002. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 7,15. Тираж 341 экз. Зак. 602. Изд. № 2854/4. С6234.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138